

松山市産チョウ類目録

菊原勇作

〒790-8571 松山市二番町四丁目 7-2 松山市役所農林水産課 (E-mail: kikuhara@city.matsuyama.ehime.jp)

Yusaku KIKUHARA (2012) List of species of Butterflies (Insecta: Lepidoptera) in Matsuyama City, Ehime Prefecture, Shikoku, Japan. 2nd version. pp. 177-194. In: Committee for Surveys of Natural Environment of Matsuyama City (Chief Editor: Kazuo ISHIKAWA) (ed.) Checklist of the Wild Animals, Fungi, and Plants of Matsuyama City, 2012. Published by the Department of Environment, Matsuyama City, 404 pp. (Matsuyama City Hall, Agriculture, Forestry and Fisheries Division, Nibancho 4-7-2, Matsuyama City, 790-8571 Japan)

Abstract — As the second version of species list of butterflies of Matsuyama City, Ehime Prefecture, Shikoku, Japan, originally published in 2002, this report presents full list of opilionid species so far recorded from the area of the city. The list consists of a total of 108 opilionid species belonging to 5 families.

緒言

松山市のチョウ類研究は非常に長い歴史があり、今日までに膨大な知見が蓄積されている。以下に松山市におけるチョウ類研究史のあらましを紹介する。

1892年(明治25年)に愛媛県尋常中学校(後の愛媛県立松山中学校, 愛媛県立松山東高等学校)が設立されると、翌1893年(明治26年)には博物科教師であった土屋勇之輔により、松山市近傍で採集された34種のチョウ類目録(土屋1893a, 土屋1893b)が発表されている。この目録は横浜在住の英国人博物学者ヘンリー・プライヤーの『日本蝶類図譜』(H. Pryer 1886~1889)に基づいた高度に学術的なもので、今日においても引用に耐えうるものとなっている。

1904年(明治37年)に宮島幹之助による『日本蝶類図説』, 松村松年による『日本千虫図解』が相次いで発刊されると、愛媛県立松山中学校の生徒の間でチョウ類研究熱が盛り上がり“黄金期”を迎える。この時代に永井(1912)・牧末(1912)らが相次いで愛媛県産チョウ類目録を発表した。牧末(1912)によると県内から71種が記録されているが、残念ながら詳しい採集地等が未記載であり、ここに収録することはできない。

第一次世界大戦の影響で松山中学校のチョウ類研究熱は下火となったが、“黄金期”を支えた高橋進が1930年(昭和5年)に帰松したことで再びチョウ類研究熱が盛り上がり、成人組から中学生・小学生までチョウ類研究を行うようになった(井手1952)。松山中学校の生徒が発表したチョウ類目録(増岡・是澤1935)は当時の松山

市内のチョウ相を知るうえで貴重なものである。しかし高橋進の急逝と第二次世界大戦の影響でチョウ類研究熱は再び下火となり、当時の標本の大半が戦災により焼失した。

1945年(昭和20年)に愛媛県立農林専門学校(後の愛媛大学農学部)が設立されると石原保が着任し昆虫学教室が開設された。アマチュアの蝶類研究熱も回復し始め、“黄金期”の一員であった井手秀信は私立新田高等学校の教師となり、多くの後進を育成した。1951年(昭和26年)に楠博幸・桑田一男らが中心となり松山昆虫同好会が組織され、今日に至る松山市のチョウ類研究のプロ・アマ両輪体制が整った。またチョウ目の専門学会である日本鱗翅学会が発足し、松山・愛媛の枠を飛び出し日本全国に研究対象を求める動きも活発になった。この時代に発表された愛媛県産チョウ類目録では104種が記録されている(楠ほか1952)。

1970年(昭和45年)に松山昆虫同好会が解散した以後も、様々な同好会が発足解散を繰り返したが、現在も松山の地にアマチュア蝶類研究は根付いており、日々新たな知見が蓄積され続けている。(文中敬称略)

概要

本稿は2002年に発行され91種のチョウ類を記録した「松山市産昆虫類目録」(大林ほか2002)のチョウ類部分の全面改定版である。旧北条市、旧中島町との合併により面積が拡大したこと、2002年以降の新知見の追加、また前述した膨大な既知記録を再調査したことにより、17種増の

108 種を松山市産チョウ類として記録する。

なお、108 種のうち 9 種は台風等の理由で偶然に飛来し一時的に発生するなどした、松山市には本来土着しない迷蝶である。

旧市町別では旧松山市から 106 種。旧北条市から 90 種。旧中島町から 40 種となっている。うち旧松山市からのみ記録がある種は 18 種、旧北条市からのみ記録がある種は 2 種である。

島嶼部からは興居島より 16 種、釣島より 9 種、鹿島より 19 種、安居島より 3 種、中島より 25 種、怒和島より 30 種、二神島より 15 種、津和地島より 18 種、睦月島より 16 種、野忽那島より 7 種、由利島より 8 種となっている。

凡 例

1. 種の配列および学名は日本昆虫学会日本昆虫目録編集委員会鱗翅目分科会の日本産蝶類和名学名便覧に従った。(猪又敏男・植村好延・矢後勝也・神保宇嗣・上田恭一郎 2010-2012) <http://binran.lepimages.jp/>
2. 採集データは地名(個体数, 採集年月日 dd.mm.yy, 採集者名) で表記。
3. 【既知】は既知記録。なお、108 種全てが松山市からの既知種である。

Lepidoptera チョウ目

Hesperoidea セセリチョウ上科

Hesperiidae セセリチョウ科

Coeliadinae アオバセセリ亜科

1. *Burara aquilina aquilina* (Speyer, 1879) キバナセセリ. 【松山市絶滅危惧 I 類 (CR+EN)】【既知】 福見山 (楠・桑田 1952). 米野町 (石原 1953). 白潰~明神ヶ森 (菊原 2001).
2. *Choaspes benjaminii japonicus* (Murray, 1875) アオバセセリ. 【既知】 船ヶ谷町, 高縄山 (楠ほか 1952). 福見山 (楠 1961b). 福見川町 (有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 下伊台町 (喜多 1989). 湯山柳, 菅沢町 (井上 1999). 畑寺町 (井上 1995). 食場町 (窪田 1999b). 宿野町, 杉立町, 玉谷町 (大林ほか 2002). 明神ヶ森 (窪田 2002b). 青波町 (窪田 2005). 鷹子町, 窪野町 (曾我部 2009). 九川 (窪田 2009).

Pyrginae チャマダラセセリ亜科

3. *Daimio tethys tethys* (Ménétrières, 1857) ダイミョウセセリ. 【既知】 三坂峠 (増岡・是澤 1935). 杉立町, 河中町 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 大西谷 (武智ほか 1960). 福見川町 (有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 畑寺町 (片岡 1985). 下伊台町 (喜多 1989). 藤野町 (窪田 1993). 末町 (窪田 1996). 神次郎町 (窪田 1997). 食場町 (窪田

1998a). 桜谷町 (窪田 1999b). 麓, 恵良山 (窪田 2000b). 宿野町, 玉谷町 (大林ほか 2002). 川の郷町, 明神ヶ森 (窪田 2002b). 湯山柳 (窪田 2003a). 菅沢町 (窪田 2008). 九川 (窪田 2009).

4. *Erynnis montana montana* (Bremer, 1861) ミヤマセセリ. 【既知】 御幸寺山, 道後 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 怒和島 (楠・武智 1958b). 杉立町 (楠 1959b). 福見川町 (有田 1962). 米野町 (石原ほか 1973). 上伊台町, 宿野町 (井上 1988). 下伊台町 (喜多 1989). 大井野町, 湯山柳 (井上 1999). 久谷町, 横谷 (井上 1993). 東野 (生物部 1993). 末町 (窪田 1996). 東川町 (窪田 1999b). 食場町, 九川 (窪田 1999b). 河中町 (窪田 2003a). 水口町 (窪田 2004). 腰折山 (窪田 2007).
5. *Pyrgus maculatus maculatus* (Bremer et Grey, 1852) チャマダラセセリ. 【松山市絶滅危惧 I 類 (CR+EN)】【既知】 道後, 伊台, 杉立町, 三坂峠 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 文京町 (井手 1958). 宿野町, 青波町, 藤野町 (篠永 1958). 閏谷, 横谷 (楠 1959a). 下伊台町 (桑田 1961). 福見川町 (有田 1962). 潮見 (楠 1963). 瀬戸風峠 (矢野ほか 1965). 吉藤 (井手 1970). 米野町 (山岡 1971). 御幸寺山 (井手 1972a). 末町 (井手 1974). 東大栗町, 九川 (竹東・有田 1979). 河中町, 大井野町 (井上 1987). 玉谷町 (大林ほか 2002). 水口町 (井上 2003). 音田谷, 白潰, 河野, 大西谷 (太田 2005b).

Hesperiinae セセリチョウ亜科

6. *Isoteinon lamprospilus lamprospilus* C. Felder et R. Felder, 1862 ホソバセセリ. 【既知】 杉立町, 河中町, 高縄山 (楠ほか 1952). 港山町 (富田 1961). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 下伊台町 (喜多 1989). 柳谷町 (井上 1990). 菅沢町 (井上 1991). 大井野町 (窪田 1996). 食場町, 藤野町 (窪田 1998a). 太山寺 (窪田 2000b). 宿野町, 玉谷町, 東方町 (大林ほか 2002). 青波町 (窪田 2004). 湯山柳 (窪田 2012a).
7. *Thoressa varia* (Murray, 1875) コチャバナセセリ. 【既知】 杉立町, 高縄山 (楠ほか 1952). 大西谷 (武智ほか 1960). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 下伊台町 (喜多 1989). 東野 (生物部 1993). 畑寺町, 菅沢町 (窪田 1999b). 久谷町 (窪田 2001). 玉谷町 (大林ほか 2002). 食場町 (窪田 2006b). 西野町, 九川 (窪田 2009). 末町 (窪田 2010b).
8. *Notocrypta curvifascia curvifascia* (C. Felder et R. Felder, 1862) クロセセリ. 立岩 (lex., 22. IX. 2006, 高橋士朗). 【既知】 松山城山 (窪田

- 2002a). 浄瑠璃町 (曾我部 2006a). 食場町 (林 2010b).
9. *Thymelicus sylvaticus sylvaticus* (Bremer, 1861) ヘリグロチャバネセセリ. 【松山市情報不足 (DD)】 【既知】 三坂峠 (楠ほか 1952). 【備考】 1941 年に大政四郎氏による採集記録があるのみ。また 1938 年に三坂峠でスジグロチャバネセセリ *T. leoninus* の採集記録があり(楠ほか 1952), 本種の誤同定と考えられる。
10. *Ochlodes ochraceus* (Bremer, 1861) ヒメキマダラセセリ. 【既知】高縄山 (楠ほか 1952). 福見山, 三坂峠 (楠 1961b). 米野町 (石原ほか 1973). 白潰 (菊原 2001). 久谷町 (窪田 2001). 水ヶ峠 (大林ほか 2002). 畑寺町 (窪田 2006b).
11. *Potanthus flavus flavus* (Murray, 1875) キマダラセセリ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 松山城山, 高縄山 (楠ほか 1952). 福見山 (井上ほか 1953). 津和地島 (楠・武智 1958a). 怒和島 (楠・武智 1958b). 大西谷 (武智ほか 1960). 湯山 (楠 1961b). 港山町 (富田 1961). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 畑寺町 (片岡 1985). 東野, 湯山柳, 三坂峠 (窪田 1988). 下伊台町 (喜多 1989). 藤野町 (窪田 1993). 出合, 重信川河口 (国交省 1993). 宿野町 (生物部 1993). 石手川ダム (窪田 1998a). 市坪 (国交省 1998). 食場町 (菊原ほか 1999). 太山寺 (窪田 2000b). 杉立町 (窪田 2001). 石手, 玉谷町, 鷹子町, 南梅本町, 津吉町 (大林ほか 2002). 菅沢町 (窪田 2005). 麓 (窪田 2012c).
12. *Polytremis pellucida pellucida* (Murray, 1875) オオチャバネセセリ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 石手川, 杉立町, 高縄山 (楠ほか 1952). 大西谷 (武智ほか 1960). 港山町 (富田 1961). 御幸寺山 (井手 1972a). 食場町 (矢野・矢野 1997). 下伊台町 (喜多 1997). 東野, 畑寺町 (太田 1998a). 菅沢町 (窪田 1999b). 名石山, 上難波 (窪田 2000b). 上伊台町 (窪田 2001). 石手, 津吉町 (大林ほか 2002). 浄瑠璃町 (窪田 2003b). 青波町 (窪田 2008). 末町 (窪田 2010b).
13. *Pelopidas mathias oberthuri* Evans, 1937 チャバネセセリ. 【既知】石手川, 湯山, 船ヶ谷町 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 二神島 (楠ら 1957). 松江町 (富田 1958). 中島 (楠・武智 1958b). 大西谷 (井手 1959). 福見川町 (有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 小坂, 東野 (窪田 1988). 下伊台町 (喜多 1990). 食場町 (窪田 1997). 宮西 (藤井 1998b). 市坪, 出合, 重信川河口 (国交省 1998). 鷹子町 (窪田 1999b). 古三津 (菊原ほか 1999). 石手, 杉立町, 平井町, 東山町 (大林ほか 2002). 森松町 (国交省 2003). 水口町 (窪田 2005). 津和地島 (太田ほか 2009). 菅沢町 (窪田 2009).
14. *Pelopidas jansonis* (Butler, 1878) ミヤマチャバネセセリ. 【松山市準絶滅危惧 (NT)】 【既知】古三津 (楠ほか 1952). 米野町 (石原 1953). 三坂峠 (楠 1961b). 福見川町 (有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972b). 杉立町 (窪田 1987). 玉谷町 (大林ほか 2002).
15. *Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey, 1852) イチモンジセセリ. 【既知】大峰ヶ台 (増岡・是澤 1935). 港山町 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 津和地島, 二神島 (楠ら 1957). 三津 (富田 1958). 怒和島, 中島 (楠・武智 1958b). 睦月島, 野忽那島 (楠・武智 1959). 鹿島 (楠 1959c). 興居島 (楠・武智 1960). 大西谷 (武智ほか 1960). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 小坂, 久谷町 (窪田 1988). 下伊台町 (喜多 1989). 藤野町 (窪田 1993). 森松町, 市坪, 出合, 重信川河口 (国交省 1993). 東野 (生物部 1993). 宮西 (藤井 1998a). 持田町, 食場町 (菊原ほか 1999). 谷町 (大林ほか 2002). 大峰ヶ台, 水口町 (窪田 2005). 菅沢町 (窪田 2008). 杉立町 (窪田 2010a).
- Papilionoidea アゲハチョウ上科
Papilionidae アゲハチョウ科
Parnassiinae ウスバアゲハ亜科
Parnassiini ウスバアゲハ族
16. *Parnassius citrinarius citrinarius* Motschulsky, 1866 ウスバアゲハ. 【既知】福見山 (毛利 1952). 福見川町 (有田 1962). 杉立町 (窪田 1987). 米野町 (藤井 1988). 大井野町 (山岡 1988). 河中町 (井上 1999). 神次郎町 (井上 1990). 高縄山 (井上 1992). 東川町, 久谷町 (大林ほか 2002). 川の郷町 (窪田 2002b).
- Papilioninae アゲハチョウ亜科
Troidini キシタアゲハ族
17. *Atrophaneura alcinous alcinous* (Klug, 1836) ジャコウアゲハ. 【既知】堀之内, 杉立町, 港山町, 森松町, 久谷川 (楠ほか 1952). 三津 (富田 1961). 河中町 (有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 市坪南 (太田 1988a). 立岩川 (窪田 1990). 小野川 (生物部 1993). 井門町 (窪田 1997). 米野町 (窪田 1998a). 西石井 (窪田 1999b). 小野公園 (菊原ほか 1999). 南町 (太田 2000b). 道後, 姫原, 中野町 (大林ほか 2002). 重信川河口 (国交省 2003). 権現町 (野本 2005a). 大峰ヶ台 (窪田 2005). 市坪西 (窪田 2010b). 湯山柳 (窪田 2012a).
- Papilionini アゲハチョウ族
18. *Papilio machaon hippocrates* C. Felder et R. Felder, 1864 キアゲハ. 【既知】松山市近傍

- (土屋 1893a). 大峰ヶ台, 高縄山 (増岡・是澤 1935). 松ノ木, 大月山 (楠ほか 1952). 津和地島 (楠・武智 1958a). 三津 (富田 1958). 鹿島 (楠 1959c). 大西谷 (武智ほか 1960). 五明 (楠 1962). 福見川町 (有田 1962). 米野町 (山岡 1963). 御幸寺山 (井手 1972a). 下伊台町 (喜多 1989). 出合 (国交省 1993). 宿野町 (生物部 1993). 末町 (窪田 1996). 市坪 (国交省 1998). 菅沢町 (窪田 1999b). 名石山 (窪田 2000b). 上伊台町, 太山寺 (窪田 2001). 石手, 畑寺町, 高野町, 杉立町, 玉谷町 (大林ほか 2002). 浄瑠璃町 (窪田 2002b). 麓 (窪田 2004). 水口町 (藤井 2005). 食場町, 藤野町, 横谷 (窪田 2005). 城山町 (窪田 2006b). 西野町 (窪田 2009). 湯山柳 (窪田 2012a). 朝生田町 (窪田 2012c).
19. *Papilio xuthus* Linnaeus, 1767 アゲハ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 大峰ヶ台, 荏原 (増岡・是澤 1935). 松山城山, 石手川, 太山寺 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 二神島 (楠ら 1957). 津和地島 (楠・武智 1958a). 怒和島, 中島 (楠・武智 1958b). 三津 (富田 1958). 睦月島 (楠・武智 1959). 鹿島 (楠 1959c). 興居島 (楠・武智 1960). 五明 (楠 1962). 福見川町 (有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 小坂, 下伊台町, 久谷川 (窪田 1988). 新立町 (窪田 1993). 森松町, 市坪, 出合, 重信川河口 (国交省 1993). 東野, 杉立町, 星岡山 (生物部 1993). 南町, 末町 (窪田 1996). 持田町, 古三津 (窪田 1998a). 宮西 (藤井 1998a). 大井野町, 鷹子町 (窪田 1999b). 勝岡町 (豊島 2000). 釣島 (窪田 2001). 津吉町 (大林ほか 2002). 食場町 (窪田 2003a). 湯山柳, 菅沢町, 常竹 (窪田 2004). 水口町 (藤井 2005). 北条辻 (太田 2005a). 窪野町, 浄瑠璃町, 久谷町, 横谷 (窪田 2005). 城山町 (窪田 2006b). 余戸中, 余戸南 (窪田 2010b). 庄 (林 2011). 麓 (藤井 2011c).
20. *Papilio protenor demetrius* Stoll, 1782 クロアゲハ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 三坂峠 (増岡・是澤 1935). 久米, 大月山 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 津和地島, 二神島 (楠・武智 1958a). 怒和島, 中島 (楠・武智 1958b). 三津 (富田 1958). 鹿島 (楠 1959c). 興居島 (楠・武智 1960). 五明 (楠 1962). 福見川町, 福見山 (有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 畑寺町 (片岡 1985). 小坂 (窪田 1988). 下伊台町 (喜多 1989). 杉立町 (窪田 1989). 市坪, 出合 (国交省 1993). 松山城山, 食場町, 東野, 星岡山, (生物部 1993). 菅沢町 (窪田 1996). 森松町 (国交省 1998). 古三津 (窪田 1998a). 溝辺町, 東山町, 久谷町 (大林ほか 2002). 上伊台町 (窪田 2002b). 重信川河口 (国交省 2003). 大峰ヶ台, 石手, 麓, 常竹 (窪田 2004). 太山寺 (窪田 2005). 恵良山 (窪田 2006b). 九川 (窪田 2009). 湯山柳 (窪田 2012a).
21. *Papilio macilentus macilentus* Janson, 1877 オナガアゲハ. 【既知】高縄山 (楠ほか 1952). 五明 (楠 1962). 河中町, 福見川町 (有田 1962). 米野町 (山岡 1963). 下伊台町 (喜多 1989). 宿野町 (生物部 1993). 大井野町, 松山城山 (窪田 1999b). 上伊台町 (大林ほか 2002). 湯山柳 (窪田 2002b). 末町, 川の郷町 (窪田 2003a). 青波町 (窪田 2007). 九川 (窪田 2009). 杉立町 (窪田 2010a).
22. *Papilio memnon thunbergii* von Siebold, 1824 ナガサキアゲハ. 【既知】石手川, 大峰ヶ台, 山西町, 太山寺 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 杉立町 (楠 1959b). 大西谷 (武智ほか 1960). 福見川町 (有田 1962). 祝谷東町 (矢野ほか 1965). 御幸寺山 (井手 1972a). 平田町 (竹束・有田 1979). 畑寺町 (片岡 1985). 下伊台町 (喜多 1989). 立花 (井上 1990). 余戸西 (井上 1993). 市坪 (国交省 1993). 松山城山 (生物部 1993). 食場町 (井上 1995). 持田町 (窪田 1998a). 重信川河口 (国交省 1998). 樽味 (窪田 2001). 東野, 鷹子町 (大林ほか 2002). 柳井町, 出合 (窪田 2002b). 小栗町 (太田 2002). 窪野町, 久谷町 (窪田 2005). 余戸中 (窪田 2007). 怒和島 (太田ほか 2009). 余戸南 (窪田 2009). 泊町 (窪田 2010b). 菅沢町 (窪田・太田 2011).
23. *Papilio helenus nicconicolens* Butler, 1881 モンキアゲハ. 【既知】大峰ヶ台 (増岡・是澤 1935). 石手川, 道後, 御幸寺山 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 怒和島 (楠・武智 1958b). 杉立町 (楠 1959b). 鹿島 (楠 1959c). 祝谷東町 (矢野ほか 1965). 米野町 (石原ほか 1973). 畑寺町 (片岡 1985). 下伊台町 (喜多 1989). 市坪, 出合 (国交省 1993). 東野 (生物部 1993). 食場町, 太山寺, 久谷町 (窪田 1998a). 松山城山 (窪田 1999b). 上伊台町 (窪田 2001). 谷町, 玉谷町 鷹子町 (大林ほか 2002). 高野町, 末町, 菅沢町, 恵良山 (窪田 2003a). 東川町, 麓 (窪田 2004). 由利島 (菊原 2011). 湯山柳 (窪田 2012a).
24. *Papilio dehaanii dehaanii* C. Felder et R. Felder, 1864 カラスアゲハ. 【既知】大峰ヶ台, 三坂峠 (増岡・是澤 1935). 石手川, 松ノ木, 太山寺, 高縄山 (楠ほか 1952). 津和地島 (楠・武智 1958a). 怒和島, 中島 (楠・武智 1958b). 清水山 (富田 1958). 鹿島 (楠 1959c). 大西谷 (武智ほか 1960). 五明 (楠 1962). 河中町, 福見川町, 福見山 (有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 畑寺町 (片岡 1985). 下伊台町 (喜多 1989). 杉立町 (窪

田 1989). 東野 (生物部 1993). 菅沢町 (窪田 1996). 食場町 (窪田 1999b). 名石山 (窪田 2000b). 東山町 (大林ほか 2002). 川の郷町, 明神ヶ森 (窪田 2002b). 東川町 (窪田 2004). 麓 (藤井 2011c). 湯山柳 (窪田 2012a). 宿野町 (窪田 2012c).

25. *Papilio maackii* Ménétrières, 1858 ミヤマカラスアゲハ. 【既知】城山町, 湯山, 河中町, 高縄山 (楠ほか 1952). 福見川町, 福見山 (井上ほか 1953). 杉立町 (越智 1954). 米野町 (石原ほか 1973). 九川 (竹束・有田 1979). 大井野町 (井上 1993). 御幸寺山 (窪田 1998a). 下伊台町, 東野 (窪田 1999b). 樽味 (窪田 2001). 溝辺町 (大林ほか 2002). 明神ヶ森 (窪田 2002b). 太山寺 (窪田 2010b). 湯山柳 (窪田 2012a). 食場町 (窪田 2012c).

Graphiini アオスジアゲハ族

26. *Graphium sarpedon nipponum* (Fruhstorfer, 1903) アオスジアゲハ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 石手川, 山西町, 古三津 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 鹿島 (楠 1959c). 福見川町 (有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 堀之内 (竹束・有田 1979). 松山城山, 下伊台町 (窪田 1988). 杉立町 (窪田 1989). 空港通 (藤井 1993). 森松町, 出合, 市坪 (国交省 1993). 東野, 星岡山, 小野川 (生物部 1993). 岩崎町, 南吉田町 (窪田 1996). 宮西 (藤井 1998a). 菅沢町 (窪田 2000b). 太山寺, 釣島 (窪田 2001). 溝辺町, 上伊台町 (大林ほか 2002). 柳井町 (窪田 2002b). 食場町, 川の郷町 (窪田 2003a). 重信川河口 (国交省 2003). 大峰ヶ台, 朝生田町, 麓 (窪田 2004). 水口町 (窪田 2005). 由利島 (菊原 2011). 湯山柳 (窪田 2012a).

Pieridae シロチョウ科

Coliadinae モンキチョウ亜科

Gonepterygini ヤマキチョウ族

27. *Eurema mandarina mandarina* (de l'Orza, 1869) キタキチョウ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 大峰ヶ台 (増岡・是澤 1935). 石手川 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 津和地島, 二神島 (楠ら 1957). 怒和島, 中島 (楠・武智 1958b). 三津 (富田 1958). 睦月島 (楠・武智 1959). 鹿島 (楠 1959c). 大西谷 (武智ほか 1960). 興居島 (楠・武智 1960). 五明 (楠 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 小坂, 杉立町 (窪田 1988). 下伊台町 (喜多 1989). 小野町, 藤野町 (窪田 1993). 森松町, 市坪, 出合, 重信川河口 (国交省 1993). 松山城山, 東野, 宿野町 (生物部 1993). 畑寺町, 大井野町 (窪田 1996). 湯山柳

(窪田 1998a). 桜谷町 (真中 1998). 宮西 (藤井 1998). 鷹子町 (窪田 1999b). 吉藤 (菊原ほか 1999). 食場町, 麓 (窪田 2000b). 上伊台町, 久谷町, 釣島 (窪田 2001). 溝辺町, 上高野町, 津吉町, 東方町 (大林ほか 2002). 末町 (窪田 2002b). 河中町 (窪田 2003a). 太山寺, 菅沢町 (窪田 2004). 水口町 (藤井 2005). 石手, 窪野町, 久谷, 横谷 (窪田 2005). 福見川町 (林 2006). 萱町, 西野町 (窪田 2009). 恩地町, 柳谷町 (菊原・太田 2010). 土居田町 (藤井 2011b). 【備考】かつてはキチョウ *E. hecabe* とされた種だが, 近年になってトカラ列島渡瀬線以北にはキチョウは分布しないことが明らかとなり, 四国産はすべてキタキチョウ *E. mandarina* となった. 本稿ではかつてキチョウとして市内から記録された種を本種と見なす.

28. *Eurema laeta betheseba* (Janson, 1878) ツマグロキチョウ. 【松山市準絶滅危惧 (NT)】【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 大峰ヶ台 (増岡・是澤 1935). 衣山, 山西町, 太山寺, 杉立町 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 津和地島, 二神島 (楠ら 1957). 清水山 (楠 1958). 松江町 (富田 1958). 睦月島, 野忽那島 (楠・武智 1959). 高井町 (楠 1961a). 祝谷東町 (矢野ほか 1965). 御幸寺山 (井手 1972a). 潮見 (竹束・有田 1979). 米野町 (井上 1990). 中土手 (菊原 2001). 平井町, 東方町 (大林ほか 2002). 吉藤 (野本 2005b). 鷹子町 (曾我部 2006b). 下難波 (窪田 2006a). 怒和島 (太田ほか 2009). 食場町 (林 2009b). 湯山柳 (窪田 2012a).

29. *Gonepteryx aspasia nipponica* Verity, 1909 スジボソヤマキチョウ. 【松山市絶滅危惧 II 類 (VU)】【既知】杉立町, 三坂峠, 高縄山 (楠ほか 1952). 福見山 (井上ほか 1953). 河中町 (桑田 1959). 米野町 (山岡 1963).

Coliadini モンキチョウ族

30. *Colias erate poliographa* (Motschulsky, 1861) モンキチョウ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 太山寺, 重信川 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 怒和島, 中島 (楠・武智 1958b). 三津 (富田 1958). 睦月島 (楠・武智 1959). 大西谷 (井手 1959). 五明 (楠 1962). 福見川町 (有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 下伊台町 (喜多 1989). 杉立町 (窪田 1993). 森松町, 市坪, 出合, 重信川河口 (国交省 1993). 東野 (生物部 1993). 桜谷町, 紅葉町 (真中 1998). 古三津 (窪田 1999b). 吉藤 (菊原ほか 1999). 上伊台町 (窪田 2001). 鷹子町, 平井町, 東方町 (大林ほか 2002). 食場町 (窪田 2002b). 菅沢町 (窪田 2004). 平田町 (野本 2005c). 馬木町 (野本

2005d). 横谷 (窪田 2005). 市坪西, 九川 (窪田 2009). 古川南 (窪田 2010b). 東垣生町 (窪田 2011). 湯山柳 (窪田 2012a).

31. *Catopsilia pomona pomona* (Fabricius, 1775) ウスキシロチョウ. 【既知】馬木町 (野本 1941). 【備考】松山市には土着しない迷蝶である。大内川堤での1例(1♂, 7.IX.1941, 野本三男)が知られる。

Pierinae モンシロチョウ亜科

Anthocharidini ツマキチョウ族

32. *Anthocharis scolymus scolymus* Butler, 1866 ツマキチョウ. 【既知】石手川 (増岡・是澤 1935). 港山町, 三坂峠 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 杉立町 (楠 1959b). 太山寺 (富田 1961). 五明 (楠 1962). 福見川町 (有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 下伊台町 (喜多 1989). 東野, 食場町, 大井野町 (井上 1995). 末町, ひばりヶ丘, 大峰ヶ台 (窪田 1996). 湯山柳, 上伊台町 (窪田 1998a). 畑寺町, 東川町 (窪田 1999b). 玉谷町, 久谷町 (大林ほか 2002). 森松町, 出合 (国交省 2003). 水口町 (窪田 2004). 城山町, 大西谷 (窪田 2006b). 小野町 (窪田 2008). 西野町 (窪田 2009). 九川 (窪田 2011). 青波町, 菅沢町 (窪田 2012c).

Pierini モンシロチョウ族

33. *Pieris rapae crucivora* Boisduval, 1836 モンシロチョウ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 大峰ヶ台, 山越 (増岡・是澤 1935). 石手川, 山西町 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 津和地島, 二神島 (楠ら 1957). 怒和島, 中島 (楠・武智 1958b). 三津 (富田 1958). 睦月島, 野忽那島 (楠・武智 1959). 大西谷 (井手 1959). 興居島 (楠・武智 1960). 五明 (楠 1962). 福見川町 (有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 久谷川 (窪田 1988). 下伊台町 (喜多 1989). 藤野町 (窪田 1993). 森松町, 市坪, 出合, 重信川河口 (国交省 1993). 東野 (生物部 1993). 立花, 古三津 (窪田 1998a). 宮西 (藤井 1998a). 土居田町 (窪田 1999b). 持田町 (菊原ほか 1999). 食場町 (窪田 2000b). 小栗町 (太田 2000b). 保免中 (太田 2001). 高野町, 谷町, 吉藤 (大林ほか 2002). 和泉北, 菅沢町, 常竹 (窪田 2004). 水口町 (藤井 2005). 太山寺, 窪野町 (窪田 2005). 余戸南, 市坪西, 宿野町, 九川 (窪田 2009). 東垣生町 (藤井 2009a). 杉立町 (窪田 2010a). 余戸西 (窪田 2010b). 畑寺町 (窪田 2011). 柳井町, 富久町 (藤井 2011a). 湯山柳 (窪田 2012a). 青波町, 西野町 (窪田 2012c).

34. *Pieris melete* Ménétrières, 1857 スジグロシロ

チョウ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 大峰ヶ台 (増岡・是澤 1935). 高縄山 (楠 1952). 怒和島 (楠・武智 1958b). 松江町 (富田 1958). 大西谷 (武智ほか 1960). 五明 (楠 1962). 福見川町 (有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 下伊台町, 久谷川 (窪田 1988). 東野 (生物部 1993). 森松町 (国交省 1998). 湯山柳 (窪田 1999b). 食場町, 大井野町 (菊原ほか 1999). 松山城山, 久谷町, 腰折山, 釣島 (窪田 2001). 上高野町, 谷町, 東方町 (大林ほか 2002). 九川, 明神ヶ森 (窪田 2002b). 末町, 河中町 (窪田 2003a). 東川町 (窪田 2004). 水口町 (藤井 2005). 市坪 (山口 2005). 太山寺, 菅沢町 (窪田 2005). 神次郎町, 城山町, 恩地町 (菊原・太田 2010). 杉立町 (窪田 2010a).

35. *Pieris nesis japonica* Shirôzu, 1952 ヤマトスジグロシロチョウ. 【既知】湯山, 杉立町, 三坂峠, 高縄山 (桑田 1952). 米野町 (石原 1953). 津和地島, 二神島 (楠ら 1957). 怒和島 (楠・武智 1958b). 福見川町 (有田 1962). 河中町 (山岡 1963). 食場町, 宿野町, 玉谷町, 大井野町, 水ヶ峠 (大林ほか 2002). 上伊台町, 東川町 (窪田 2001). 明神ヶ森 (窪田 2002b). 末町 (窪田 2003a). 水口町 (窪田 2004). 菅沢町 (窪田 2012b). 【備考】本種の分類は混乱しており, 本稿では白水 (2002) に従いヤマトスジグロシロチョウ *P. nesis* としたが, タイプ標本の調査や発香鱗・交尾器の形状から山形県以南産を独立種シロウズスジグロシロチョウ *Artogeia japonica* とする説もある (松田 2009). 本種は瀬戸内海島嶼部ではスズシロソウを食草としている (出嶋 1995).

Lycaenidae シジミチョウ科

Miletinae アシナガシジミ亜科

Miletini アシナガシジミ族

36. *Taraka hamada hamada* (H. Druce, 1875) ゴイシジミ. 【既知】石手川 (増岡・是澤 1935). 船ヶ谷町 (楠ほか 1952). 忽那山, 菖蒲谷 (和田 1959a). 太山寺 (富田 1961). 泉町 (稲田・富永 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 福見川町 (竹東・有田 1979). 杉立町 (窪田 1987). 下伊台町 (喜多 1989). 南町 (井上 1999). 藤野町 (窪田 1993). 市坪 (国交省 1993). 食場町, 畑寺町 (井上 1995). 樽味 (窪田 1998a). 東野 (喜多 1999b). 小野公園 (菊原ほか 1999). 石手, 溝辺町, 玉谷町, 津吉町 (大林ほか 2002). 末町 (窪田 2003a). 久谷町 (窪田 2005). 宿野町 (窪田 2006b). 菅沢町 (窪田 2009). 泊町 (窪田 2010b).

Curetinae ウラギンシジミ亜科

37. *Curetis acuta paracuta* de Nicéville, 1902 ウラギンシジミ. 【既知】三坂峠 (増岡・是澤 1935). 船ヶ谷町, 杉立町, 高縄山 (楠ほか 1952). 大西谷 (武智ほか 1960). 太山寺, 古三津 (富田 1961). 祝谷東町 (矢野ほか 1965). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 畑寺町 (片岡 1985). 下伊台町 (喜多 1989). 小野町 (窪田 1993). 市坪 (国交省 1993). 東野, 宿野町 (生物部 1993). 食場町, 末町 (窪田 1996). 菅沢町 (窪田 1998a). 桜谷町 (真中 1998). 出合 (国交省 1998). 九川 (窪田 1999b). 大井野町 (窪田 2000b). 釣島 (窪田 2001). 高野町, 谷町, 東方町 (大林ほか 2002). 河中町 (窪田 2003a). 福見山 (井上 2005). 吉藤 (窪田 2006b). 北梅本町 (窪田 2007). 怒和島, 二神島 (太田ほか 2009). 鷹子町 (曾我部 2010b). 湯山柳 (窪田 2012a).
- Lycaeninae シジミチョウ亜科
Theclini ミドリシジミ族
38. *Arhopala bazalus turbata* (Butler, 1882) ムラサキツバメ. 【既知】宿野町 (増岡・是澤 1935). 松山市東北部 (森川 1939). 道後, 杉立町, 船ヶ谷町, 高縄山 (楠ほか 1952). 松山城山 (宮武ほか 1956). 二神島 (楠ら 1957). 大西谷 (武智ほか 1960). 高井町 (楠 1961a). 祝谷東町 (矢野ほか 1965). 御幸寺山 (井手 1972a). 平田町 (竹束・有田 1979). 畑寺町 (片岡 1985). 食場町, 平井町 (井上 1988). 朝生田町 (井上 1991). 下伊台町 (喜多 1992). 末町 (井上 1995). 横谷 (窪田 1996). 持田町 (窪田 1998a). 柳井町 (窪田 2002b). 窪野町 (窪田 2004).
39. *Arhopala japonica* (Murray, 1875) ムラサキシジミ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 松山城山, 港山町, 船ヶ谷町 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 清水山 (富田 1958). 祝谷東町 (矢野ほか 1965). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 畑寺町 (片岡 1985). 下伊台町 (喜多 1989). 市坪 (国交省 1993). 東野, 星岡山 (生物部 1993). 食場町, 麓 (窪田 1996). 桜谷町 (真中 1998). 森松町 (国交省 1998). 杉立町, 末町, 湯山柳 (窪田 1999b). 菅沢町, 恵良山 (窪田 2000b). 上伊台町, 久谷町 (窪田 2001). 玉谷町, 鷹子町, 津吉町 (大林ほか 2002). 水口町 (藤井 2005). 太山寺, 大井野町 (窪田 2005). 余戸中 (窪田 2008).
40. *Artopoetes pryeri pryeri* (Murray, 1873) ウラゴマダラシジミ. 【既知】三坂峠 (楠ほか 1952). 福見山 (有田 1962). 米野町 (野本 1970). 湯山柳, 藤野町, 大井野町 (高市 1985). 宿野町, 梅木町 (林ほか 1988). 柳谷町 (井上 1991). 麓, 高縄山 (井上 1992). 恩地町 (井上 1993). 九川 (喜多 1995). 石手川ダム, 末町 (窪田 1998a). 下伊台町 (喜多 1999a). 水口町 (井上 2004). 菅沢町 (窪田・太田 2011).
41. *Antigius attilia attilia* (Bremer, 1861) ミズイロオナガシジミ. 中島栗井 (2exs., 10. VI. 2006, 菊原勇作). 【既知】石手川 (増岡・是澤 1935). 松山城山, 高縄山 (楠ほか 1952). 御幸寺山 (井手 1958). 横谷 (桑田 1958). 三坂峠 (武智 1958). 大西谷 (武智ほか 1960). 瀬戸風峠 (矢野ほか 1965). 河中町, 東大栗町 (竹束・有田 1979). 湯山柳 (高市 1985). ウツバリ峠 (林ほか 1988). 上伊台町, 麓 (井上 1988). 下伊台町 (喜多 1989). 柳谷町 (井上 1991). 常竹 (井上 1992). 星岡山 (生物部 1993). 奥道後 (吉川 1994). 末町 (窪田 1996). 菅沢町 (窪田 1997). 太山寺, 恵良山 (窪田 2000b). 宿野町, 玉谷町, 杉立町 (大林ほか 2002). 梅津寺町 (窪田 2005). 星岡町, 窪野町 (窪田 2006b).
42. *Wagimo signatus* (Butler, 1882) ウラミスジシジミ. 【松山市絶滅危惧 II 類 (VU)】 【既知】菅沢町 (太田 2008a).
43. *Japonica lutea lutea* (Hewitson, 1865) アカシジミ. 【既知】石手川 (増岡・是澤 1935). 松山城山, 杉立町, 横谷, 高縄山 (楠ほか 1952). 宿野町 (毛利 1952). 米野町 (石原 1953). 御幸寺山, 三坂峠 (桑田 1958). 大西谷 (武智ほか 1960). 瀬戸風峠 (太田 1962). 湯山柳, 藤野町 (高市 1985). 上伊台町, 余戸西 (井上 1988). 下伊台町 (喜多 1989). 玉谷町 (井上 1990). 菅沢町, 柳谷町 (井上 1994). 奥道後 (吉川 1994). 石手川ダム, 末町 (窪田 1998a). 食場町 (窪田 1999b). 東野, 麓 (窪田 2000b). 鷹子町 (曾我部 2006c). 星岡町 (窪田 2006b). 平和通 (太田 2008b). 三番町 (窪田 2010b).
44. *Japonica saepestriata saepestriata* (Hewitson, 1865) ウラナミアカシジミ. 【松山市絶滅危惧 I 類 (CR+EN)】 【既知】閨谷 (木村 1949). 横谷 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 大西谷 (井手 1959). 和気町 (井手 1968). 御幸寺山 (井手 1972b).
45. *Neozephyrus japonicus japonicus* (Murray, 1875) ミドリシジミ. 【松山市準絶滅危惧 (NT)】 【既知】三坂峠 (山岡 1971). 御幸寺山 (井手 1972a).
46. *Chrysozephyrus brilliantinus* (Staudinger, 1887) アイノミドリシジミ. 【松山市情報不足 (DD)】 【既知】高縄山 (武智 1952, 1953). 杉立町 (太田 1959). 【備考】松山市内からは高縄山の記録(1♀, 23.VII. 1952, 武智文彦)と, 杉立町の記録(1♀, 4. X. 1958, 太田喬三)が知られる。
47. *Favonius orientalis* (Murray, 1875) オオミドリシジミ. 【既知】高縄山 (楠ほか 1952). 杉立町, 夏目, 横谷 (井手 1953). 福見川町 (井上ほか 1953). 米野町 (石原 1953). 大西谷 (井手 1959). 御幸寺山 (井手 1972a). 湯山柳 (高

市 1985). ウツバリ峠, 梅木町, 大井野町 (林ほか 1988). 上伊台町 (井上 1988). 下伊台町 (喜多 1989). 麓 (井上 1991). 東川町 (吉川 1994). 末町 (窪田 1998a). 玉谷町 (大林ほか 2002). 菅沢町 (窪田 2009).

48. *Sibatanozephyrus fujisanus fujisanus* (Matsumura, 1910) フジミドリシジミ. 【松山市準絶滅危惧 (NT)】 【既知】 高縄山 (楠ほか 1952).

Eumaeini カラスシジミ族

49. *Rapala arata* (Bremer, 1861) トラフシジミ. 【既知】 松山市, 杉立町, 三坂峠, 高縄山 (楠ほか 1952). 港山町 (富田 1961). 福見川町 (有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 久谷町 (窪田 1988). 菅沢町 (井上 1988). 下伊台町 (喜多 1989). 柳谷町, 大井野町 (井上 1992). 東野 (生物部 1993). 食場町, 湯山柳 (井上 1994). 末町, 川の郷町 (窪田 1996). 鷹子町 (大林ほか 2002). 東川町, 横谷 (窪田 2002b). 水口町 (窪田 2005). 城山町 (窪田 2006b). 青波町 (窪田 2012c).
50. *Callophrys ferrea ferrea* (Butler, 1866) コツバメ. 【既知】 大峰ヶ台 (増岡・是澤 1935). 杉立町, 高縄山 (楠ほか 1952). 福見川町 (有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (藤井 1988). 青波町, 大井野町 (井上 1999). 下伊台町 (喜多 1993). 湯山柳 (井上 1994). 九川 (窪田 2000b). 東野, 平井町 (大林ほか 2002). 末町, 河中町 (窪田 2003a). 食場町, 水口町 (窪田 2006b). 西野町 (窪田 2012c).

Lycaenini ベニシジミ族

51. *Lycaena phlaeas chinensis* (C. Felder, 1862) ベニシジミ. 【既知】 松山市近傍 (土屋 1893a). 大峰ヶ台 (増岡・是澤 1935). 石手川, 衣山, 船ヶ谷町 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 津和地島 (楠ら 1957). 二神島 (楠・武智 1958a). 怒和島, 中島 (楠・武智 1958b). 三津 (富田 1958). 睦月島 (楠・武智 1959). 大西谷 (井手 1959). 興居島 (楠・武智 1960). 五明 (楠 1962). 福見川町 (有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 東野, 下伊台町, 久谷川, 久谷町 (窪田 1988). 杉立町, 小野町, 藤野町 (窪田 1993). 森松町, 市坪, 出合, 重信川河口 (国交省 1993). 松山城山 (生物部 1993). 末町, 吉藤, 北山町 (窪田 1998a). 東川町 (窪田 1999b). 上伊台町 (窪田 2001). 谷町, 鷹子町, 津吉町, 東方町 (大林ほか 2002). 河中町 (窪田 2003a). 食場町, 菅沢町 (窪田 2004). 水口町 (藤井 2005). 大井野町, 横谷 (窪田 2005). 樽味 (窪田 2007). 窪野町 (矢野 2009d). 西野町 (窪田 2009).

東垣生町 (藤井 2009a). 神次郎町, 恩地町, 柳谷町 (菊原・太田 2010). 湯山柳 (窪田 2012a). 麓 (窪田 2012c).

Polyommataini ヒメシジミ族

52. *Niphanda fusca fusca* (Bremer et Grey, 1852) クロシジミ. 【松山市絶滅 (EX)】 【既知】 三坂峠 (楠ほか 1952). 宿野町 (井手 1980c). 杉立町, 青波町 (太田 2011). 【備考】 青波町産の5個体(2♂♂3♀♀, 6.VII. 1941, 木村茂)が現存している.
53. *Lampides boeticus* (Linnaeus, 1767) ウラナシジミ. 【既知】 松山市近傍 (土屋 1893b). 大峰ヶ台 (増岡・是澤 1935). 三津 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 津和地島, 二神島 (楠ら 1957). 怒和島, 中島 (楠・武智 1958b). 睦月島, 野忽那島 (楠・武智 1959). 鹿島 (楠 1959c). 興居島 (楠・武智 1960). 御幸寺山 (井手 1972a). 小坂 (窪田 1988). 下伊台町 (喜多 1989). 藤野町 (窪田 1993). 市坪, 出合 (国交省 1993). 食場町 (窪田 1997). 桜谷町 (真中 1998). 宮西 (藤井 1998b). 森松町 (国交省 1998). 久谷町 (菊原ほか 1999). 太山寺, 泊町 (窪田 2000b). 石手, 東野, 杉立, 姫原, 鷹子町, 東方町 (大林ほか 2002). 米野町, 恵良山 (窪田 2003a). 菅沢町, 平井町 (窪田 2009). 東垣生町 (藤井 2009a). 湯山柳 (窪田 2012a).
54. *Euchrysops cnejus* (Fabricius, 1798) オジロシジミ. 【既知】 松山市 (太田 1961). 【備考】 松山市には土着しない迷蝶である。ドイツ人 Martin による記録(1♂, 13. VII. 1916)が知られる.
55. *Pseudozizeeria maha argia* (Ménétrières, 1857) ヤマトシジミ. 【既知】 松山市近傍 (土屋 1893a). 大峰ヶ台 (増岡・是澤 1935). 重信川, 山西町, 古三津 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 津和地島, 二神島 (楠ら 1957). 怒和島, 中島 (楠・武智 1958b). 睦月島, 野忽那島 (楠・武智 1959). 鹿島 (楠 1959c). 興居島 (楠・武智 1960). 五明 (楠 1962). 福見川町 (有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 味酒町 (太田 1988b). 下伊台町 (喜多 1989). 藤野町 (窪田 1993). 森松町, 市坪, 出合, 重信川河口 (国交省 1993). 末町 (窪田 1996). 桜谷町 (窪田 1997). 東本 (矢野 1998). 岩崎町, 衣山 (窪田 1998a). 宮西 (藤井 1998a). 鷹子町 (窪田 1999b). 食場町, 吉藤, 菅沢町 (窪田 2000b). 太山寺, 釣島 (窪田 2001). 東野, 上伊台町 (大林ほか 2002). 窪野町 (窪田 2005). 杉立町 (窪田 2010a). 湯山柳 (窪田 2012a).
56. *Zizina emelina emelina* (de l'Orza, 1869) シルビアシジミ. 【松山市絶滅 (EX)】 【既知】 文

- 京町, 食場町, 御幸寺山, 粟井 (木村 1947). 立花 (林 1950). 杉立町 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 潮見, 東大栗, 松山空港, 横谷 (楠 1954). 堀江町 (井手 1980b). 姫原 (大林ほか 2002). 河野 (吉富 2011).
57. *Everes argiades argiades* (Pallas, 1771) ツバメシジミ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 石手川, 和気町 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 津和地島 (楠ら 1957). 怒和島, 中島 (楠・武智 1958b). 三津 (富田 1958). 睦月島, 野忽那島 (楠・武智 1959). 大西谷 (井手 1959). 鹿島 (楠 1959c). 興居島 (楠・武智 1960). 福見川町 (有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 東野, 久谷町 (窪田 1988). 下伊台町 (喜多 1989). 藤野町 (窪田 1993). 森松町, 出合 (国交省 1993). 食場町 (窪田 1997). 樽味 (窪田 1998a). 市坪 (国交省 1998). 古三津 (窪田 1999b). 太山寺 (窪田 2000b). 溝辺町, 杉立町, 東山町, 鷹子町 (大林ほか 2002). 宿野町, 河中町, 菅沢町 (窪田 2003a). 重信川河口 (国交省 2003). 水口町 (藤井 2005). 城山町 (窪田 2006b). 北梅本町 (窪田 2007). 西野町 (窪田 2009). 市坪西 (窪田 2010b). 湯山柳 (窪田 2012a). 青波町 (窪田 2012c).
58. *Tongeia fischeri shojii* Satonaka, 2003 クロツバメシジミ. 【松山市準絶滅危惧 (NT)】 【既知】 恵良山 (窪田 1999a). 腰折山 (窪田 2000a).
59. *Celastrina argiolus ladonides* (de l'Orza, 1869) ルリシジミ. 中島栗井 (1ex., 10. VI. 2006, 菊原勇作). 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 大峰ヶ台 (増岡・是澤 1935). 衣山, 山西町 (楠ほか 1952). 怒和島 (楠・武智 1958b). 三津 (富田 1958). 睦月島 (楠・武智 1959). 鹿島 (楠 1959c). 大西谷 (武智ほか 1960). 五明 (楠 1962). 福見川町 (有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 溝辺町, 下伊台町 (福田 1988). 藤野町 (窪田 1993). 森松町, 市坪, 出合 (国交省 1993). 東野 (生物部 1993). 食場町, 末町 (窪田 1997). 持田町, 古三津, 河中町 (窪田 1998a). 宮西 (藤井 1998a). 重信川河口 (国交省 1998). 桜谷町, 大井野町 (窪田 1999b). 太山寺, 九川, 恵良山 (窪田 2000b). 松山城山, 上伊台町, 釣島 (窪田 2001). 高野町, 鷹子町, 東方町 (大林ほか 2002). 東川町, 水口町, 麓, 安居島 (窪田 2004). 横谷 (窪田 2005). 菅沢町, 湯山柳 (窪田 2009). 杉立町 (窪田 2010a). 西野町 (窪田 2011). 由利島 (菊原 2011).
60. *Celastrina sugitanii sugitanii* (Matsumura, 1919) スギタニルリシジミ. 【松山市準絶滅危惧 (NT)】 【既知】 大井野町 (大林ほか 2002). 米野町 (窪田 2011).
61. *Acytolepis puspa ishigakiana* (Matsumura, 1929) ヤクシマルリシジミ. 庄 (1ex., 23. XI. 2009, 高橋士朗). 【既知】 太山寺 (菊原 2000). 麓, 恵良山 (窪田 2006b). 菅沢町, 高縄山 (窪田 2007). 御幸寺山 (窪田 2008). 怒和島 (太田ほか 2009). 泊町 (矢野 2009b). 南町 (太田 2009a). 食場町 (林 2009a). 平井町, 小野町 (矢野 2009c). 米野町 (菊原・太田 2010). 平井町, 由良町, 門田町 (窪田 2010b). 鷹子町 (曾我部 2010a). 由利島 (菊原 2011).
62. *Udara albocaerulea albocaerulea* (Moore, 1879) サツマシジミ. 【既知】 御幸寺山 (楠・桑田 1952). 湯山 (井手 1955). 杉立町 (和田 1959b). 馬木町 (野本 1966). 三坂峠 (太田・有田 1962). 米野町 (石原ほか 1973). 湯山柳 (湊 1987). 高縄山 (井上 1991). 末町, 大井野町 (窪田 1996). 菅沢町 (窪田 2000b). 上伊台町, 平井町 (大林ほか 2002). 青波町 (窪田 2004).
63. *Chilades pandava* (Horsfield, 1829) クロマダラソテツシジミ. 【既知】 怒和島, 津和地島 (太田ほか 2009). 中島, 睦月島, 野忽那島 (窪田 2009a). 持田町, 御幸寺山, 北条辻, 鹿島 (矢野 2009a). 光洋台, 夏目, 柳原 (片岡・松本 2010). 南町, 宮西, 福角町, 上伊台町, 権現町 (太田 2010). 粟井 (豊島 2010). 下伊台町, 束本, 北久米町, 鷹子町, 久保, 鹿峰, 河野中須賀 (窪田 2011). 北持田町, 安居島 (窪田 2012d). 【備考】 松山市には土着しない迷蝶である。2009年~2010年にかけて松山市内で大量発生した。

Nymphalidae タテハチョウ科

Libytheinae テングチョウ亜科

64. *Libythea lepita celtoides* Fruhstorfer, (1909) テングチョウ. 【既知】 三坂峠 (増岡・是澤 1935). 杉立町, 高縄山 (楠ほか 1952). 太山寺 (富田 1961). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町, 河中町 (山岡 1963). 湯山柳 (窪田 1988). 下伊台町 (喜多 1989). 食場町, 星岡町 (窪田 1998a). 森松町 (国交省 1998). 麓 (窪田 2000b). 畑寺町, 上伊台町, 東川町, 釣島 (窪田 2001). 東野 (大林ほか 2002). 明神ヶ森 (窪田 2002b). 末町, 川の郷町 (窪田 2003a). 大井野町, 水口町, 窪野町, 横谷 (窪田 2005).

Danainae マダラチョウ亜科

Danaini マダラチョウ族

65. *Danaus chrysippus chrysippus* (Linnaeus, 1758) カバマダラ. 星岡町 (1ex., 9. X. 1999, 山内晃). 【既知】 鷹子町 (窪田 1998b). 持田町 (菊原 1999). 古川南 (菅 1999). 西垣生町 (窪田 1999c). 土居田町 (太田 2000b). 井門町, 南

- 高井町 (藤井 2009b). 【備考】松山市には土着しない迷蝶である。
66. *Danaus genutia genutia* (Cramer, 1779) スジグロカバマダラ. 【既知】文京町 (林 1968). 【備考】松山市には土着しない迷蝶である。愛媛大学構内で採集された 1 例(1♀, 18. IX. 1967, 林芳郎)が知られる。
67. *Parantica sita nipponica* (Moore, 1883) アサギマダラ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893b). 道後, 湧ヶ淵, 高縄山 (楠ほか 1952). 福見山 (井上ほか 1953). 二神島 (楠ら 1957). 中島 (楠・武智 1958b). 鹿島 (楠 1959c). 米野町 (石原ほか 1973). 杉立町 (窪田 1988). 下伊台町 (喜多 1989). 食場町 (窪田 1998a). 玉谷町, 福見川町, 東方町 (大林ほか 2002). 由利島 (窪田 2002b). 鷹子町 (曾我部 2006b). 湯山柳 (窪田 2012a). 菅沢町 (窪田 2012c).
- Heliconiinae ドクチョウ亜科
Heliconiini ドクチョウ族
68. *Argyronome laodice japonica* (Ménétriès, 1857) ウラギンスジヒョウモン. 【松山市絶滅危惧 II 類 (VU)】【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 青波町, 高縄山 (増岡・是澤 1935). 大月山 (楠ほか 1952). 米野町 (石原ほか 1973). 杉立町 (窪田 1987). 下伊台町 (喜多 1990). 湯山柳 (窪田 2012a).
69. *Argyronome ruslana* (Motschulsky, 1866) オオウラギンスジヒョウモン. 【松山市絶滅危惧 II 類 (VU)】【既知】大峰ヶ台, 福見山 (楠ほか 1952). 三坂峠 (山岡 1971).
70. *Argynnis paphia tsushimana* Fruhstorfer, 1906 ミドリヒョウモン. 【既知】松山市, 港山町, 高縄山 (楠ほか 1952). 福見山 (井上ほか 1953). 大西谷 (武智ほか 1960). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 下伊台町, 杉立町, 湯山柳 (窪田 1988). 末町 (窪田 1996). 食場町, 川の郷町 (窪田 1998a). 久谷町 (菊原ほか 1999). 石手, 玉谷町, 東山町 (大林ほか 2002). 上伊台町, 明神ヶ森 (窪田 2002b). 窪野町 (窪田 2005). 麓 (窪田 2007). 菅沢町 (窪田 2008).
71. *Damora sagana liane* (Fruhstorfer, 1907) メスグロヒョウモン. 【松山市絶滅危惧 II 類 (VU)】【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 石手川 (増岡・是澤 1935). 道後, 杉立町 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 怒和島, 中島 (楠・武智 1958b). 睦月島 (楠・武智 1959). 大西谷 (武智ほか 1960). 瀬戸風峠 (矢野ほか 1965). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (藤井 1988). 下伊台町 (窪田 1988). 柳谷町 (井上 1994). 末町, 食場町 (井上 1995). 湯山柳 (窪田 1999b). 石手, 玉谷町 (大林ほか 2002).
72. *Nephargynnis anadyomene ella* (Bremer, 1865) クモガタヒョウモン. 【松山市絶滅危惧 II 類 (VU)】【既知】三坂峠 (増岡・是澤 1935). 船ヶ谷町, 杉立町 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 福見川町, 福見山 (有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 下伊台町 (喜多 1989). 末町, 上伊台町 (大林ほか 2002). 九川 (窪田 2009).
73. *Fabriciana adippe pallescens* (Butler, 1873) ウラギンヒョウモン. 【松山市準絶滅危惧 (NT)】【既知】福見山 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 大西谷 (武智ほか 1960). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 下伊台町 (喜多 1989). 石手, 高野町, 宿野町, 玉谷町, 上伊台町 (大林ほか 2002). 杉立町 (窪田 2010a). 湯山柳 (窪田 2012a).
74. *Fabriciana nerippe* (C. Felder et R. Felder, 1862) オオウラギンヒョウモン. 【松山市絶滅 (EX)】【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 石手川, 伊台 (増岡・是澤 1935). 船ヶ谷町, 高縄山 (楠ほか 1952). 米野町 (石原 1953). 大西谷 (武智ほか 1960). 清水山, 太山寺 (富田 1961). 出合, 潮見 (竹束・有田 1979). 平田町 (井手 1980a). 杉立町 (窪田 1987). 南町, 栗井 (太田 2000a). 樽味 (菊原 2001). 道後 (大林ほか 2002). 河野 (吉富 2011).
75. *Argyreus hyperbius hyperbius* (Linnaeus, 1763) ツマグロヒョウモン. 【既知】大峰ヶ台, 三坂峠 (増岡・是澤 1935). 山西町, 重信川, 久谷川 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 中島 (楠・武智 1958b). 睦月島 (楠・武智 1959). 鹿島 (楠 1959c). 福見川町 (有田 1962). 祝谷東町 (矢野ほか 1965). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 畑寺町 (片岡 1985). 東野, 小坂, 下伊台町, 杉立町 (窪田 1988). 森松町, 市坪, 出合, 重信川河口 (国交省 1993). 宿野, 星岡山 (生物部 1993). 松山城山, 持田町, 岩崎町, 東本 (窪田 1998a). 宮西 (藤井 1998a). 紅葉町, 桜谷町, 上伊台町, 鷹子町 (窪田 1999b). 食場町, 恵良山 (窪田 2000b). 太山寺 (窪田 2001). 石手, 溝辺町 (大林ほか 2002). 柳井町 (窪田 2002b). 南町 (窪田 2003a). 水口町, 窪野町 (窪田 2005). 北梅本町 (窪田 2007). 怒和島 (太田ほか 2009). 余戸南 (窪田 2009). 菅沢町 (窪田・太田 2011). 湯山柳 (窪田 2012a).
- Limenitidinae イチモンジチョウ亜科
Limenitidini イチモンジチョウ族
76. *Limenitis camilla japonica* Ménétriès, 1857 イチモンジチョウ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 三坂峠 (増岡・是澤 1935). 杉立町, 高縄山 (楠ほか 1952). 大西谷 (武智ほか 1960). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 下伊台町 (喜多 1989). 東野, 宿

町 (生物部 1993). 麓 (窪田 1997). 食場町 (窪田 1998a). 福見川町 (窪田 1999b). 上伊台町 (窪田 2001). 上高野町, 玉谷町 (大林ほか 2002). 湯山柳, 末町 (窪田 2003a). 九川 (窪田 2006b). 菅沢町 (窪田・太田 2011).

77. *Neptis sappho intermedia* W. B. Pryer, 1877 コミスジ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 宿野町 (増岡・是澤 1935). 石手川, 山西町 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 津和地島 (楠・武智 1958a). 怒和島, 中島 (楠・武智 1958b). 清水山 (富田 1958). 鹿島 (楠 1959c). 大西谷 (武智ほか 1960). 五明 (楠 1962). 福見川町 (有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 畑寺町 (片岡 1985). 湯山柳 (窪田 1988). 下伊台町 (喜多 1989). 杉立町, 小野町 (窪田 1993). 森松町, 市坪 (国交省 1993). 東野 (生物部 1993). 大井野町 (窪田 1998a). 太山寺 (窪田 1999b). 食場町 (菊原ほか 1999). 玉谷町, 東方町 (大林ほか 2002). 水口町, 窪野町 (窪田 2005). 九川 (窪田 2009). 末町, 西野町 (窪田 2010b). 菅沢町 (窪田・太田 2011). 麓 (藤井 2011c).

78. *Neptis philyra philyra* Ménétrière, 1858 ミスジチョウ. 【既知】三坂峠 (楠ほか 1952). 杉立町 (井手 1955). 米野町 (山岡 1971). 下伊台町 (喜多 1990). 九川, 高縄山 (井上 1991). 宿野町, 玉谷町 (大林ほか 2002). 末町 (窪田 2008).

79. *Neptis pryri hamadai* Fujioka, Minotani et Fukuda, 1999 ホシミスジ. 【既知】三坂峠 (楠ほか 1952). 樽味 (宮武 1955). 恵良山 (窪田 1999a). 腰折山 (窪田 2000a). 窪野町 (2004). 西野町 (窪田 2010b).

Cyrestidini イシガケチョウ族

80. *Cyrestis thyodamas mabella* Fruhstorfer, 1898 イシガケチョウ. 【既知】杉立町, 高縄山 (楠ほか 1952). 太山寺 (富田 1961). 福見山 (有田 1962). 祝谷東町 (矢野ほか 1965). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (藤井 1988). 下伊台町 (喜多 1989). 東野, 宿野町 (生物部 1993). 末町, 平井町 (窪田 1996). 食場町 (窪田 1998a). 桜谷町 (真中 1998). 玉谷町 (窪田 1999b). 久谷町 (菊原ほか 1999). 菅沢町, 麓 (窪田 2000b). 上伊台町 (窪田 2001). 石手, 溝辺町, 高野町 (大林ほか 2002). 猿川 (窪田 2003a). 水口町, 窪野町 (窪田 2005). 湯山柳 (窪田 2012a).

Pseudoergolini スミナガシ族

81. *Dichorragia nesimachus nesiotis* Fruhstorfer, 1903 スミナガシ. 【既知】三坂峠 (増岡・是澤 1935). 杉立町, 高縄山 (楠ほか 1952).

福見川町, 福見山 (有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 九川 (竹束・有田 1979). 下伊台町 (喜多 1989). 宮西 (藤井 1998b). 食場町, 菅沢町 (井上 1999). 水口町 (窪田 2003a). 宿野町, 玉谷町 (大林ほか 2002). 末町 (窪田 2010b). 湯山柳 (窪田 2012a). 窪野町 (窪田 2012c).

Nymphalinae タテハチョウ亜科

Nymphalini タテハチョウ族

82. *Araschnia burejana burejana* Bremer, 1861 サカハチチョウ. 【既知】宿野町, 九川 (増岡・是澤 1935). 高縄山 (楠 1952). 五明 (楠 1962). 福見川町 (有田 1962). 米野町 (石原ほか 1973). 久谷町, 三坂峠 (窪田 1988). 下伊台町 (喜多 1989). 末町 (窪田 1996). 食場町, 東野, 東川町 (窪田 1999b). 杉立町, 上伊台町 (窪田 2001). 平井町, 玉谷町 (大林ほか 2002). 河中町 (窪田 2003a). 横谷 (窪田 2005). 城山町, 恩地町 (窪田 2006b). 青波町 (窪田 2007). 水口町, 柳谷町 (菊原・太田 2010). 菅沢町 (太田ほか 2012). 湯山柳 (窪田 2012a).

83. *Polygonia c-aureum c-aureum* (Linnaeus, 1758) キタテハ. 【既知】山西町, 重信川 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 松江町 (富田 1958). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (山岡 1963). 杉立町 (窪田 1987). 下伊台町 (喜多 1989). 森松町, 市坪, 出合, 重信川河口 (国交省 1993). 東野 (生物部 1993). 畑寺町, 食場町 (窪田 1996). 樽味 (窪田 1998a). 桜谷町, 紅葉町 (真中 1998). 宮西 (藤井 1998b). 古三津, 西石井, 鷹子町, 九川 (窪田 1999b). 吉藤 (菊原ほか 1999). 溝辺町 (大林ほか 2002). 東川町 (窪田 2003a). 水口町 (藤井 2005). 菅沢町, 大井野町, 窪野町 (窪田 2005). 湯山柳 (窪田 2009). 余戸南 (窪田 2010b).

84. *Polygonia c-album hamigera* (Butler, 1877) シータテハ. 【松山市絶滅危惧I類 (CR+EN)】 【既知】道後, 石手川, 高縄山 (楠ほか 1952). 御幸寺山 (井手 1958). 高井町, 中野町 (楠 1961a). 福見山 (有田 1962). 米野町, 三坂峠 (山岡 1971). 龍穩寺 (井手 1980d). 杉立町 (窪田 1987).

85. *Nymphalis xanthomelas japonica* (Stichel, 1902) ヒオドシチョウ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 石手川 (増岡・是澤 1935). 松山城 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 梅田町 (富田 1958). 大西谷 (井手 1959). 米野町 (石原ほか 1973). 下伊台町 (窪田 1988). 川の郷町 (窪田 1989). 末町 (窪田 1996). 星岡町 (窪田 1998a). 湯山柳 (窪田 1999b). 太山寺 (窪田 2000b). 上伊台町 (窪田 2001). 石手, 東

- 野, 宿野町, 玉谷町 (大林ほか 2002). 御幸寺山, 食場町 (窪田 2002b). 古三津 (窪田 2003a). 麓 (窪田 2004). 横谷 (窪田 2005). 杉立町 (窪田 2010a).
86. *Kaniska canace nojaponicum* (von Siebold, 1824) ルリタテハ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 三坂峠 (増岡・是澤 1935). 衣山, 杉立町, 興居島 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 津和地島 (楠・武智 1958a). 怒和島, 中島 (楠・武智 1958b). 鹿島 (楠 1959c). 大西谷 (武智ほか 1960). 五明 (楠 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 下伊台町 (窪田 1988). 青波町 (窪田 1989). 市坪 (国交省 1993). 東野, 宿野町, 星岡山, 小野川 (生物部 1993). 畑寺町, 食場町 (窪田 1996). 桜谷町, 紅葉町 (真中 1998). 九川 (窪田 1999b). 太山寺, 大井野町, 麓 (窪田 2000b). 上伊台町 (窪田 2001). 石手, 上高野町, 鷹子町 (大林ほか 2002). 柳井町, 出合 (窪田 2002b). 菅沢町 (窪田 2003a). 水口町 (藤井 2005). 窪野町, 横谷 (窪田 2005). 湯山柳, 泊町 (窪田 2010b).
87. *Vanessa indica indica* (Herbst, 1794) アカタテハ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 青波町, 高縄山 (楠ほか 1952). 中島 (楠・武智 1958b). 三津 (富田 1958). 鹿島 (楠 1959c). 五明 (楠 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 小坂, 下伊台町, 朝生田町 (窪田 1988). 市坪, 出合, 重信川河口 (国交省 1993). 宿野町 (生物部 1993). 樽味 (窪田 1998a). 桜谷町 (真中 1998). 食場町 (菊原ほか 1999). 上伊台町 (窪田 2001). 石手, 玉谷町 (大林ほか 2002). 森松町 (国交省 2003). 東野, 東川町, 麓 (窪田 2004). 水口町 (藤井 2005). 大井野町, 窪野町, 横谷 (窪田 2005). 福見川町 (林 2006). 末町, 湯山柳, 杉立町, 九川 (窪田 2009). 恩地町, 柳谷町 (菊原・太田 2010). 菅沢町 (窪田・太田 2011).
88. *Vanessa cardui* (Linnaeus, 1758) ヒメアカタテハ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 三坂峠 (増岡・是澤 1935). 道後, 大峰ヶ台, 石手川 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 三津 (富田 1958). 大西谷 (武智ほか 1960). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (藤井 1988). 朝生田町, 下伊台町, 湯山柳, 久谷町 (窪田 1988). 森松町, 市坪, 出合, 重信川河口 (国交省 1993). 河中町 (窪田 1998a). 桜谷町 (真中 1998). 食場町, 菅沢町, 鷹子町 (窪田 1999b). 古三津 (菊原ほか 1999). 名石山 (窪田 2000b). 釣島 (窪田 2001). 東野, 溝辺町, 谷町, 津吉町 (大林ほか 2002). 柳井町 (窪田 2002b). 太山寺 (窪田 2004). 水口町 (藤井 2005). 横谷 (窪田 2005). 怒和島 (太田ほか 2009). 東垣生町 (藤井 2009a). 杉立町 (窪田 2010a). 由利島 (菊原 2011).
- Kallimini コノハチョウ族
89. *Junonia orithya orithya* (Linnaeus, 1758) アオタテハモドキ. 【既知】鷹子町, 若葉町 (林 2005). 【備考】松山市には土着しない迷蝶である。1982年に鷹子町で採集された1♂と, 松山市立三津浜中学校の校庭での記録(1♀, 22.VII.1990, 坂本卓)が知られる。
90. *Hypolimnas misippus* (Linnaeus, 1764) メスアカムラサキ. 【既知】小栗, 大峰ヶ台 (楠ほか 1952). 港山 (楠・桑田 1952). 松山城山 (竹束・有田 1979). 道後公園 (林 2005). 鷹子町 (曾我部 2006c). 太山寺 (太田 2006). 【備考】松山市には土着しない迷蝶である。
91. *Hypolimnas bolina* (Linnaeus, 1758) リュウキュウムラサキ. 【既知】御幸寺山 (林 2005). 【備考】松山市には土着しない迷蝶である。愛媛県護国神社裏で採集された1例(1♀, 20.IX.1983, 藤井正一)が知られる。本種は亜種により色彩が異なるが, いずれの亜種が飛来したものは不明。
- Apaturinae コムラサキ亜科
92. *Apatura metis substituta* Butler, 1873 コムラサキ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 古三津, 河中町 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 御幸寺山 (井手 1972a). 杉立町 (窪田 1987). 松山城山 (生物部 1993). 森松町 (国交省 1998). 持田町 (窪田 1998a). 石手, 上伊台町, 吉藤, 鷹子町, 平井町 (大林ほか 2002). 浄瑠璃町 (窪田 2005).
93. *Hestina persimilis japonica* (C. Felder et R. Felder, 1862) ゴマダラチョウ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 石手川, 三坂峠 (増岡・是澤 1935). 石手, 杉立町, 高縄山 (楠ほか 1952). 港山町 (富田 1958). 大西谷 (武智ほか 1960). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 下伊台町 (喜多 1989). 市坪 (国交省 1993). 松山城山, 宿野町 (生物部 1993). 岩崎町, 畑寺町, 末町 (窪田 1998a). 紅葉町 (真中 1998). 宮西 (藤井 1998b). 重信川河口 (国交省 1998). 食場町 (窪田 2000b). 東野, 上高野町 (大林ほか 2002). 出合 (窪田 2002b). 森松町 (国交省 2003). 大峰ヶ台, 湯山柳, 菅沢町 (窪田 2004). 太山寺 (窪田 2005). 麓 (藤井 2011c). 由利島 (菊原 2011).
94. *Sasakia charonda charonda* (Hewitson, 1863) オオムラサキ. 【松山市準絶滅危惧 (NT)】 【既知】三坂峠 (増岡・是澤 1935). 杉立町, 青波町, 高縄山 (楠ほか 1952). 福見川町 (山岡 1963). 御幸寺山 (井手 1972b). 米野町 (石原ほか 1973). 潮見 (竹束・有田 1979). 石手川

ダム, 麓 (井上 1988). 下伊台町 (喜多 1989). 菅沢町 (井上 1999). 湯山柳, 川の郷町, 玉谷町 (高市 1990). 末町 (窪田 1996). 宿野町, 上伊台町 (大林ほか 2002). 太山寺 (矢野 2008). 東野 (林 2010a).

Satyrinae ジャノメチョウ亜科

Satyrini ジャノメチョウ族

95. *Ypthima argus argus* Butler, 1866 ヒメウラナミジャノメ. 【既知】松山市, 杉立町, 高縄山 (楠ほか 1952). 二神島 (楠・武智 1958a). 怒和島, 中島 (楠・武智 1958b). 三津 (富田 1958). 睦月島 (楠・武智 1959). 鹿島 (楠 1959c). 興居島 (楠・武智 1960). 大西谷 (武智ほか 1960). 五明 (楠 1962). 福見川町 (有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 下伊台町 (喜多 1989). 森松町, 市坪, 出合, 重信川河口 (国交省 1993). 松山城山, 東野, 宿野町 (生物部 1993). 末町 (窪田 1996). 湯山柳, 古三津 (窪田 1999b). 樽味, 吉藤 (菊原ほか 1999). 食場町, 久谷町 (窪田 2001). 玉谷町, 鷹子町, 津吉町 (大林ほか 2002). 河中町, 川の郷町 (窪田 2003a). 菅沢町 (窪田 2004). 水口町 (窪田 2005). 恩地町 (窪田 2006b).
96. *Ypthima multistriata nipponica* Murayama, 1969 ウラナミジャノメ. 【松山市絶滅危惧 I 類 (CR+EN)】 【既知】杉立町, 高縄山 (楠ほか 1952). 御幸寺山 (井手 1972a). 宿野町, 河中町 (竹東・有田 1979). 玉谷町, 上総町 (大林ほか 2002). 湯山柳 (窪田 2012a).
97. *Minois dryas bipunctata* (Motschulsky, 1860) ジャノメチョウ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 大峰ヶ台 (増岡・是澤 1935). 道後, 大月山, 高縄山 (楠ほか 1952). 港山町 (富田 1961). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 堀江町, 杉立町 (竹東・有田 1979). 河中町, 久谷町 (竹東・有田 1979). 下伊台町 (喜多 1989). 麓 (窪田 1996). 菅沢町 (窪田 1998a). 食場町 (窪田 2001). 溝辺町, 玉谷町 (大林ほか 2002). 水口町, 庄 (窪田 2005). 湯山柳 (窪田 2012a).
98. *Kirinia fentoni* (Butler, 1877) キマダラモドキ. 【既知】高縄山 (楠ほか 1952). 福見川町 (山岡 1963). 福見山 (楠ほか 1964). 横谷 (山岡 1971). 杉立町 (窪田 1987). 上伊台町, 常竹, 大西谷, 麓 (井上 1988). 下伊台町 (喜多 1989). 湯山柳, 玉谷町, 菅沢町 (井上 1989). 食場町 (井上 1994). 末町, 苞木 (井上 1995). 御幸寺山 (窪田 2000b). 上総町 (大林ほか 2002). 常光寺町 (窪田 2009).
99. *Lethe sicelis* (Hewitson, 1862) ヒカゲチョウ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 大峰ヶ台 (増岡・是澤 1935). 道後, 山西町, 杉立町 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 怒和島, 中島 (楠・武智 1958b). 三津 (富田 1958). 大西谷 (武智ほか 1960). 福見川町 (山岡 1963). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 下伊台町 (喜多 1989). 末町 (窪田 1996). 麓 (窪田 1997). 湯山柳, 久万ノ台, 古三津, 星岡町 (窪田 1998a). 桜谷町 (窪田 1999b). 上伊台町, 太山寺 (窪田 2001). 石手, 畑寺町, 上高野町, 鷹子町 (大林ほか 2002). 食場町 (窪田 2002b). 菅沢町, 常竹 (窪田 2004). 東野 (窪田 2005). 窪野町 (窪田 2006b).
100. *Lethe diana diana* (Butler, 1866) クロヒカゲ. 【既知】大月山 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 怒和島, 中島 (楠・武智 1958b). 睦月島 (楠・武智 1959). 大西谷 (武智ほか 1960). 米野町 (石原ほか 1973). 下伊台町 (喜多 1989). 末町 (窪田 1996). 食場町, 神次郎町 (窪田 1997). 菅沢町, 北山町 (窪田 1998a). 桜谷町 (窪田 1999b). 小富士山, 恵良山 (窪田 2000b). 和泉北 (太田 2000b). 杉立町 (窪田 2001). 東野, 玉谷町 (大林ほか 2002). 太山寺, 御幸寺山, 明神ヶ森 (窪田 2002b). 松山城山, 上伊台町, 安居島 (窪田 2004). 大峰ヶ台, 梅津寺町 (窪田 2005). 小野町 (窪田 2006b). 道後町, 石手, 泊町 (窪田 2007). 湯山柳 (窪田 2009). 畑寺町 (窪田 2011).
101. *Lethe marginalis* (Motschulsky, 1861) クロヒカゲモドキ. 【松山市絶滅危惧 II 類 (VU)】 【既知】高縄山 (楠 1952). 福見川町 (井上ほか 1953). 杉立町 (楠 1959b). 大井野町 (井上 1988). 久谷町 (井上 1994). 米野町 (窪田 1996).
102. *Zophaessa callipteris* (Butler, 1877) ヒメキマダラヒカゲ. 【松山市準絶滅危惧 (NT)】 【既知】米野町 (石原ほか 1973). 久谷町 (太田 2009b).
103. *Neope goschkevitschii* (Ménétrières, 1857) サトキマダラヒカゲ. 【既知】高縄山 (高橋 1970). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 平田町 (竹東・有田 1979). 下伊台町 (喜多 1989). 市坪 (国交省 1993). 末町 (窪田 1996). 明神丘, 久谷町 (窪田 1998a). 東野 (窪田 1999b). 石手, 東山町, 東方町 (大林ほか 2002). 食場町 (窪田 2002b). 湯山柳 (窪田 2004). 太山寺 (窪田 2005). 菅沢町 (窪田 2006b). 杉立町 (窪田 2010a). 【備考】高橋(1970)によって日本産キマダラヒカゲ属 *Neope* が 2 種に分けられた。それ以前のキマダラヒカゲの記録はどちらのものであるかはつきりしないため、本稿では採録しなかった。
104. *Neope nipponica nipponica* Butler, 1881 ヤマキマダラヒカゲ. 【既知】米野町 (石原ほか 1973). 白潰 (菊原 2001).

105. *Mycalesis gotama fulginia* Fruhstorfer, 1911
ヒメジャノメ。【既知】松山市近傍 (土屋
1893a). 杉立町 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠
1952). 中島 (楠・武智 1958b). 三津 (富田
1958). 大西谷 (武智ほか 1960). 福見川町
(有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町
(石原ほか 1973). 下伊台町 (喜多 1989). 市
坪, 出合 (国交省 1993). 東野 (生物部 1993).
大井野町 (窪田 1998a). 森松町 (国交省
1998). 食場町 (菊原ほか 1999). 末町 (窪田
2001). 玉谷町, 鷹子町, 東方町 (大林ほか
2002). 菅沢町, 常竹 (窪田 2004). 浄瑠璃町
(窪田 2005). 上伊台町 (窪田 2007). 九川
(窪田 2009).

106. *Mycalesis francisca perdiccas* Hewitson, 1862
コジャノメ。【既知】松山市近傍 (土屋 1893a).
石手川 (増岡・是澤 1935). 高縄山 (楠ほか
1952). 大西谷 (武智ほか 1960). 福見川町
(有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町
(石原ほか 1973). 下伊台町 (喜多 1989). 杉
立町 (窪田 1989). 宿野町 (生物部 1993). 末
町 (窪田 1997). 食場町 (窪田 1998a). 桜谷
町 (窪田 1999b). 松山城山, 上伊台町, 菅沢
町 (窪田 2001). 東野, 玉谷町, 鷹子町 (大林
ほか 2002). 太山寺, 明神ヶ森 (窪田 2002b).
湯山柳 (窪田 2003a). 麓 (窪田 2004). 水口
町 (窪田 2005). 青波町 (窪田 2007).

Melanitini コノマチョウ族

107. *Melanitis leda leda* (Linnaeus, 1758) ウスイ
ロコノマチョウ。立岩米之野 (1ex., 8. VIII.
2009, 高橋士朗). 上難波 (1ex., 9. IX. 2009,
高橋士朗). 【既知】祝谷 (竹束・有田 1979). 三
番町 (湊 1986). 杉立町 (窪田 1987). 食場町
(林 1987). 樽味, 三津 (井上 1991). 森松町
(片岡 1992). 堀江町, 朝生田町 (井上 1992).
藤野町 (窪田 1993). 下伊台町 (井上 1994).
土居田町 (太田 1998b). 南堀端町 (豊島
1998). 東野 (窪田 1999b). 吉藤 (菊原ほか
1999). 東本, 古三津 (窪田 2000b). 東長戸
(窪田 2002b). 東一万 (太田 2002). 水口町
(菊原・太田 2010). 【備考】松山市には土着
しない迷蝶である。

108. *Melanitis phedima oitensis* Matsumura, 1919
クロコノマチョウ。【既知】一番町, 道後 (土
屋 1893b). 松山城山, 石手川, 杉立町 (井上
1942). 三津, 船ヶ谷町 (楠ほか 1952). 高縄山
(楠 1952). 高井町 (楠 1961a). 瀬戸風峠 (太
田 1962). 福見川町 (山岡 1963). 祝谷東町
(矢野ほか 1965). 米野町 (石原ほか 1973). 下
伊台町 (喜多 1989). 食場町 (井上 1990). 久
谷町 (井上 1991). 宿野町 (井上 1992). 東野
(生物部 1993). 末町 (井上 1995). 大井野町
(窪田 1996). 畑寺町 (窪田 1998a). 森松町,

市坪, 出合 (国交省 1998). 持田町, 紅葉町,
古三津 (窪田 1999b). 御幸寺山 (菊原ほか
1999). 石手, 上高野町 (大林ほか 2002). 柳井
町, 由利島 (窪田 2002b). 重信川河口 (国交
省 2003). 城山町 (窪田 2006b). 上伊台町, 荏
原町, 泊町 (窪田 2007). 菅沢町 (窪田 2009).

【備考】1892年9月に和田義軌によって愛媛
県尋常中学校理化実験室で採集された1個体
と, 同年10月に藤山左市によって道後町の山
で採集された1個体の記録は松山市における
チョウ類の記録の最古のものである。

謝 辞

貴重な文献を貸与頂いた以下の方々に記して
お礼申し上げます。: 宮武睦夫, 酒井雅博, 吉富
博之, 矢野和之。(以上敬称略)

文 献

- Pryer. H., (1886 ~ 1889) *Rhopalocera nihonica*: a
description of the butterflies of Japan. 101pp.+10pl.
Office of the Japan mail. Yokohama.
- 有田和充 (1962) 私の好きな採集地 (福見山). やどりが,
29: 2-3.
- 石原保 (1953) 石鎚山と面河溪の昆虫相. 四国昆虫学
会会報, 3 (supplement) (蝶の部): 7-15.
- 石原保・石原隆志・木下信一・酒井雅博・古木芳枝
(1973) 演習林の鱗翅目 (愛媛大学米野々演習林の
昆虫に関する調査資料, その 1). 愛媛大学農学部演
習林報告, (10): 41-45.
- 井手秀信 (1952) 松山市を中心とした素人昆虫研究の
回顧. 松山昆虫同好会時報, 2: 1-3.
- 井手秀信 (1953) 発生の偏している数種の本県産の蝶
について. 松山昆虫同好会時報, 4: 1-2.
- 井手秀信 (1955) (続) 発生地偏している本県産の蝶
について. あげは, 2: 14-15.
- 井手秀信 (1958) 春の城北の山麓. 松山昆虫同好会短
報, 6: 1-2.
- 井手秀信 (1959) 大西谷のウラナミアカシジミ. 松山
昆虫同好会短報, 18: 1.
- 井手秀信 (1968) ウラナミアカシジミの話. 独り言, 7:
2-4.
- 井手秀信 (1970) 草原の蝶 6. 胡蝶記, 9: 1-4.
- 井手秀信 (1972a) 15. 御幸地区の蝶. 胡蝶記, 25: 4.
- 井手秀信 (1972b) 16. 御幸地区の蝶 補遺. 胡蝶記, 26:
2.
- 井手秀信 (1974) 愛媛の蝶, 愛媛新聞社, 161pp.
- 井手秀信 (1980a) 近況. 胡蝶記, 127: 4.
- 井手秀信 (1980b) 近況松山近傍から姿を消した蝶. 胡
蝶記, 128: 4.
- 井手秀信 (1980c) 近況松山近傍から姿を消した蝶. 胡
蝶記, 129: 4.
- 井手秀信 (1980d) 近況松山近傍から姿を消した蝶. 胡
蝶記, 130: 4.
- 伊藤寿 (2004) 愛媛県におけるホシミスジの採集例
(その 2). いよにす, 20: 28-29.
- 稲田春実・富永一男 (1962) 松山市内薬師寺でゴイシ

- シジミを採集する. 松山昆虫同好会時報, 18: 5.
- 井上武 (1987) チャマダラセセリを追った記録. いよにす, 3: 1-5.
- 井上武 (1988) 愛媛県産成蝶の採集記録 1987 年版. いよにす, 4: 58-68.
- 井上武 (1989) 愛媛県産成蝶の採集記録 1988 年版. いよにす, 5: 49-63.
- 井上武 (1990) 愛媛県産成蝶の採集記録 1989 年版. いよにす, 6: 50-61.
- 井上武 (1991) 愛媛県産成蝶の採集記録 1990 年版. いよにす, 7: 68-84.
- 井上武 (1992) 愛媛県産成蝶の採集記録 1991 年版. いよにす, 8: 27-42.
- 井上武 (1993) 愛媛県産成蝶の採集記録 1992 年版. いよにす, 9: 47-62.
- 井上武 (1994) 愛媛県産成蝶の採集記録 1993 年版. いよにす, 10: 32-41.
- 井上武 (1995) 愛媛県産成蝶の採集記録 1994 年版. いよにす, 11: 20-30.
- 井上武 (2003) チャマダラセセリ保護活動のその後. いよにす, 19: 6-9.
- 井上武 (2004) 正月のウラゴマダラシジミ採卵記. 愛蝶会ニュース, 105: 4.
- 井上武 (2005) ウラギンシジミの翅色異常. いよにす, 21: 42.
- 井上正亮 (1942) 松山市付近にて昭和拾六年度殊更に多数採集された *Melanitis* 属の蝶. 昆虫界, 10 (102): 527-528.
- 井上信・毛利輝典・堀川正克 (1953) 福見山の紹介 行状記 2. 松山昆虫同好会時報, 3: 27-29.
- 太田喬三 (1959) 杉立でアイノミドリシジミ 1♀を採集す. 松山昆虫同好会短報, 15: 4.
- 太田喬三 (1961) 愛媛県の迷チョウ. 愛媛の自然, 3 (9): 24.
- 太田喬三 (1962) 春の蝶をたづねて. 松山昆虫同好会時報, 17: 8.
- 太田喬三 (1988a) 初秋の重信川を探る. いよにす, 4: 1-4.
- 太田喬三 (1988b) ヒョウモンモドキの異常型とヤマトシジミの異常型. いよにす, 4: 55.
- 太田喬三 (1998a) 「功労賞」物 (もの) 1997 年度版. いよにす, 14: 14-15.
- 太田喬三 (1998b) ウスイロコノマチョウの目撃記録. 愛蝶会ニュース, 84: 4.
- 太田喬三 (2000a) 愛媛県で絶滅したと思われる蝶類数種の採集記録 (飼育記録) とその保管場所. いよにす, 16: 19-22.
- 太田喬三 (2000b) 今年の採集記. コミスジ, 19: 25-28.
- 太田喬三 (2001) 今年の採集記. コミスジ, 20: 39-43.
- 太田喬三 (2002) 今年の採集記. コミスジ, 21: 41-45.
- 太田喬三 (2005a) ナミアゲハの異常型. いよにす 21: 29-30.
- 太田喬三 (2005b) チャマダラセセリの過去の生息地一覽 保護のための一資料として. 愛蝶会ニュース, 109, 3-16.
- 太田喬三 (2006) メスアカムラサキを経ヶ森で採集. いよにす, 22: 51.
- 太田喬三 (2008a) 中予で初のウラミスジシジミを採集. いよにす, 24: 37-39.
- 太田喬三 (2008b) 町の中のアカシジミ. 愛蝶会ニュー
- ス, 122: 2-3.
- 太田喬三 (2009a) ヤクシマルリシジミの幼虫を自宅のバラで採集. いよにす, 25: 35.
- 太田喬三 (2009b) ヒメキマダラヒカゲの異常型?. いよにす, 35: 41.
- 太田喬三 (2010) 私が2010年に見たクロマダラソテツシジミの確認場所. いよにす, 26: 41.
- 太田喬三 (2011) かつて松山市にもクロシジミがいた!! 愛蝶会ニュース, 133: 12-13.
- 太田喬三・有田和充 (1962) 三坂峠のサツマシジミ, 松山昆虫同好会時報, 17: 8.
- 太田喬三・窪田聖一・林弘 (2009) 第30回採集・調査会報告 クロマダラソテツシジミの生息調査. いよにす, 25: 4-8.
- 太田喬三・林弘・窪田聖一 (2012) 松山市野外活動センターでの蝶類モニタリング調査 2011 年の調査結果. いよにす, 28: 19-30.
- 大林延夫・酒井雅博・宮武睦夫・楠博幸・桑田一男・菅晃・窪田聖一・友近裕織・佐伯英人・小川次郎 (2002) 松山市産昆虫目録. pp. 27-138. In: 松山市野生動物目録 2002. 松山市環境部. 270pp.
- 越智研一郎 (1954) ミヤマカラスアゲハ杉立に産す. あげは, 1: 53.
- 片岡敬一 (1985) 繁多寺 (松山市畑寺) 採集記 (84.8). いよにす, 1: 6.
- 片岡敬一 (1992) 1991 年度のウスイロコノマチョウ. いよにす, 8: 9-11.
- 片岡敬一・松本舞子 (2010) クロマダラソテツシジミの採集. いよにす, 26: 40.
- 菅晃 (1999) 今年もまたカバマダラ. 愛媛の虫だより, 88: 5-7.
- 菊原勇作 (1999) 松山市でカバマダラを採集. 愛蝶会ニュース, 87: 11.
- 菊原勇作 (2000) 松山市太山寺町でヤクシマルリシジミを採集. いよにす, 16: 15.
- 菊原勇作 (2001) 愛媛大学農学部環境昆虫学研究室に所蔵される高縄半島の珍しい蝶. 愛蝶会ニュース, 96: 17-19.
- 菊原勇作 (2011) 由利島でアブにたかられるの記. 愛蝶会ニュース, 134: 19-20.
- 菊原勇作・太田喬三 (2010) 第31回採集・調査会報告 チャマダラセセリの再発見を目指して. いよにす, 26: 1-2.
- 菊原勇作・渡部圭一・渡部祐子 (1999) 松山平野とその周辺のチョウ相および陸生カメムシ相, 34pp. 愛媛県立松山東高等学校生物部.
- 喜多景治 (1989) 松山市下伊台町の蝶. いよにす, 5: 4-9.
- 喜多景治 (1990) 松山市下伊台町の蝶 (第2報). いよにす, 6: 15-18.
- 喜多景治 (1992) 松山市下伊台町の蝶 (第3報). いよにす, 8: 12-13.
- 喜多景治 (1993) 松山市下伊台町の蝶 (第4報). いよにす, 9: 17.
- 喜多景治 (1995) ウラ山のウラゴマ. いよにす, 11: 11-14.
- 喜多景治 (1997) 松山市下伊台町の蝶 (第5報). いよにす, 13: 9.
- 喜多景治 (1999a) 松山市下伊台町の蝶 (第6報). いよにす, 15: 12.

- 喜多景治 (1999b) ムラサキツバメの幼虫採収例. いよにす, 15: 12.
- 木村茂 (1947) 愛媛県産蝶類雑記. 虫の友, 1 (3): 3-7.
- 木村茂 (1949) 四国産ウラナミアカシジミについて. 虫の友, 3 (1): 1-2.
- 楠博幸 (1952) 高縄山の昆虫 第一報. 松山昆虫同好会時報, 2: 10-16.
- 楠博幸 (1954) 松山市付近のシルビアシジミについて. あげは, 1: 51.
- 楠博幸 (1958) 早春の清水山の蝶. 松山昆虫同好会短報, 6: 3.
- 楠博幸 (1959a) 春の高縄山の昆虫. 松山昆虫同好会短報, 14: 1-2.
- 楠博幸 (1959b) 湯山, 杉立方面の昆虫. 愛媛の自然, 1 (5): 11-12.
- 楠博幸 (1959c) 北条市, 鹿島の昆虫. 愛媛の自然, 1 (6): 12-13.
- 楠博幸 (1961a) 春の重信川及び久谷堤の昆虫. 松山昆虫同好会時報, 12: 1-2.
- 楠博幸 (1961b) 愛媛県のセセリチョウ類. 愛媛の自然, 3 (11): 18-21.
- 楠博幸 (1962) 松山市五明方面の昆虫. 松山昆虫同好会時報, 19: 9.
- 楠博幸 (1963) 1963年のチョウの初見日 (2). 松山昆虫同好会時報, 26: 2.
- 楠博幸・山中諒・平岡卓郎 (1964) 福見山の自然. 愛媛の自然, 6 (6): 4-5.
- 楠博幸・桑田一男・岡田齊夫 (1952) 愛媛県蝶類総目録. 松山昆虫同好会時報, 1: 6-36.
- 楠博幸・桑田一男 (1952) 愛媛県より其の後明らかにされた蝶類 8 種. 松山昆虫同好会時報, 2: 32-33.
- 楠博幸・武智文彦 (1958a) 忽那七島の昆虫 II. あげは 5: 54-62.
- 楠博幸・武智文彦 (1958b) 忽那七島の昆虫 III 怒和島・中島 第三回調査報告. 松山昆虫同好会時報 6・7: 3-13.
- 楠博幸・武智文彦 (1959) 忽那七島の昆虫 IV 睦月・野忽那島調査報告. 松山昆虫同好会時報 8: 1-6.
- 楠博幸・武智文彦 (1960) 忽那七島の昆虫 興居島調査報告 1. 松山昆虫同好会時報, 9: 1-3.
- 楠博幸・武智文彦・篠永哲 (1957) 忽那七島の昆虫 I. あげは, 4: 8-18.
- 窪田聖一 (1987) 松山市杉立の蝶の変遷. いよにす, 3: 15-16.
- 窪田聖一 (1988) 蝶の訪花植物の観察例. いよにす, 4: 41-46.
- 窪田聖一 (1989) チョウの吸水行動の記録. いよにす, 5: 27-29.
- 窪田聖一 (1990) ジャコウアゲハの新産地. いよにす, 6: 25.
- 窪田聖一 (1993) お義父さんの採集された蝶. いよにす, 9: 21-28.
- 窪田聖一 (1996) 愛媛県産成蝶の採集記録 1995 年版. いよにす, 12: 18-30.
- 窪田聖一 (1997) 愛媛県産成蝶の採集記録 1996 年版. いよにす, 13: 26-33.
- 窪田聖一 (1998a) 愛媛県産成蝶の採集記録 1997 年版. いよにす, 14: 29-40.
- 窪田聖一 (1998b) 今年のカバマダラ騒動を振り返って. 愛蝶会ニュース, 84: 8-9.
- 窪田聖一 (1999a) (速報) 北条市で, ホシミスジとクロツバメシジミを採集. いよにす, 15: 11.
- 窪田聖一 (1999b) 愛媛県産成蝶の採集記録 1998 年版. いよにす, 15: 27-38.
- 窪田聖一 (1999c) 松前町, 松山市でカバマダラの発生を確認. 愛蝶会ニュース, 88: 5.
- 窪田聖一 (2000a) 北条市のクロツバメシジミとホシミスジ. いよにす, 16: 12-13.
- 窪田聖一 (2000b) 愛媛県産成蝶の採集記録 1999 年版. いよにす, 16: 33-41.
- 窪田聖一 (2001) 愛媛県産成蝶の採集記録 2000 年版. いよにす, 17: 27-36.
- 窪田聖一 (2002a) クロセセリ分布の謎に迫る. いよにす, 18: 37-46.
- 窪田聖一 (2002b) 愛媛県産成蝶の採集記録 2001 年版. いよにす, 18: 65-76.
- 窪田聖一 (2003a) 愛媛県産成蝶の採集記録 2002 年版. いよにす, 19: 47-56.
- 窪田聖一 (2003b) 採集情報. 愛蝶会ニュース, 103: 15-17.
- 窪田聖一 (2004) 愛媛県産成蝶の採集記録 2003 年版. いよにす, 20: 72-81.
- 窪田聖一 (2005) 愛媛県産成蝶の採集記録 2004 年版. いよにす, 21: 46-58.
- 窪田聖一 (2006a) 松山市でツマグロキチョウを採集. いよにす, 22: 44.
- 窪田聖一 (2006b) 愛媛県産成蝶の採集記録 2005 年版. いよにす, 22: 73-80.
- 窪田聖一 (2007) 愛媛県産成蝶の採集記録 2006 年版. いよにす, 23: 104-110.
- 窪田聖一 (2008) 愛媛県産成蝶の採集記録 2007 年版. いよにす, 24: 59-66.
- 窪田聖一 (2009a) 愛媛県におけるクロマダラソテツシジミの分布拡大経過. いよにす, 25: 22-29.
- 窪田聖一 (2009b) 愛媛県産成蝶の採集記録 2008 年版. いよにす, 25: 65-75.
- 窪田聖一 (2010a) 1976~1980年における松山市杉立のチョウ類群集. いよにす, 26: 30-37.
- 窪田聖一 (2010b) 愛媛県産成蝶の採集記録 2009 年版. いよにす, 26: 58-67.
- 窪田聖一 (2011) 愛媛県産成蝶の採集記録 2010 年版. いよにす, 27: 47-53.
- 窪田聖一 (2012a) 松山市石手川上流域の蝶相の変遷. いよにす, 28: 36-39.
- 窪田聖一 (2012b) 松山市菅沢町野外活動センターでヤマトスジグロシロチョウを採集. いよにす, 28: 40.
- 窪田聖一 (2012c) 愛媛県産成蝶の採集記録 2011 年版. いよにす, 28: 79-85.
- 窪田聖一 (2012d) 2011 年県内同好会誌総覧. 愛蝶会ニュース, 136: 10-12.
- 窪田聖一・太田喬三 (2011) 松山市野外活動センターでの蝶類モニタリング調査 3 年間の調査結果. いよにす, 27: 28-37.
- 桑田一男 (1952) エゾスジグロシロチョウについて. 松山昆虫同好会時報, 2: 8-9.
- 桑田一男 (1958) 私の標本箱から (その 1). 松山昆虫同好会短報, 8: 1-3.
- 桑田一男 (1959) 私の標本箱から (3). 松山昆虫同好会短報, 19: 1-2.
- 桑田一男 (1961) 雑蝶記 I. 松山昆虫同好会時報, 12: 3-4.

- 国土交通省 (1993) 重信川. 河川水辺の国勢調査. 松山河川国道事務所.
- 国土交通省 (1998) 重信川. 河川水辺の国勢調査. 松山河川国道事務所.
- 国土交通省 (2003) 重信川. 河川水辺の国勢調査. 松山河川国道事務所.
- 白水隆 (2002) 2001年の昆虫界をふりかえって. 月刊むし, 375: 2-13.
- 篠永哲 (1958) 春の石手川上流. 松山昆虫同好会短報, 6: 3.
- 曾我部弑子 (2006a) クロセセリ 新繁殖地発見: 愛媛県西条市小松町・松山市浄瑠璃町. いよにす, 22: 37-38.
- 曾我部弑子 (2006b) ツマグロキチョウ探索記 旅の終わり. いよにす, 22: 41-43.
- 曾我部弑子 (2006c) アカシジミ. いよにす, 22: 46.
- 曾我部弑子 (2009) アオバセセリ. いよにす, 25: 42-44.
- 曾我部弑子 (2010a) ヤクシマルリシジミの繁殖. 愛蝶会ニュース, 129: 7.
- 曾我部弑子 (2010b) ウラギンシジミ♀5頭の越冬. 愛蝶会ニュース, 129: 7.
- 高市謙三 (1985) 愛媛のゼフ5年. いよにす, 1: 17-28.
- 高市謙三 (1990) フジミドリは近年少なくなった(1989年採集記). いよにす, 6: 32-35.
- 高橋真弓 (1970) 日本産キマダラヒカゲ属 *Neope* に属する二つの種について. 蝶と蛾, 21 (1・2): 17-37.
- 竹東正・有田和充 (1979) 日本鱗翅学会四国支部[編] 四国の蝶, 日本鱗翅学会四国支部, 229pp.
- 武智文彦 (1952) 高縄山でミドリシジミ1♀を採集, 松山昆虫同好会時報, 2: 27.
- 武智文彦 (1953) 訂正 (ミドリシジミをアイノミドリシジミに訂正). 松山昆虫同好会時報, 3: 32.
- 武智文彦 (1958) 私の昨年6月の最終行. 松山昆虫同好会短報, 8: 3-4.
- 武智文彦・藤森信一・井手秀信 (1960) 本年第2回採集会. 松山昆虫同好会短報, 30: 1-2.
- 土屋勇之輔 (1893a) 愛媛縣松山市近傍の蝶類. 動物学雑誌, 5 (51): 32-33.
- 土屋勇之輔 (1893b) 松山市近傍蝶類目録の追加. 動物学雑誌, 5 (54): 158.
- 出嶋利明 (1995) 瀬戸内海のエゾスジグロシロチョウとスジグロシロチョウ. 四国虫報 31: 189.
- 富田裕 (1958) 松山市三津浜附近の蝶. 松山昆虫同好会時報, 10: 1-2.
- 富田裕 (1961) 松山市三津浜付近の蝶 その2. 松山昆虫同好会時報, 14: 3.
- 豊島治朗 (1998) ウスイロコノマの採集記録. 虫だより, 76: 6.
- 豊島治朗 (2000) 真っ黒アゲハ. 愛媛の虫だより, 94: 19.
- 豊島治朗 (2010) クロマダラソテツシジミが今年も発生. 愛媛の虫だより, 107: 21-22.
- 永井淑 (1912) 愛媛県産蝶類に就いて. 昆虫世界, 16 (4): 201-203.
- 野本三男 (1941) ウスキシロチョウ松山市内に産す. 虫の世界, 1 (4): 7-8.
- 野本三男 (1966) 松山市内でサツマシジミを採集. 松山昆虫同好会時報, 34: 8.
- 野本三男 (1970) ウラゴマダラシジミの新産地について. *Ishizuchi*, 1 (1): 20.
- 野本三男 (2005a) ジャコウアゲハ黒化型♀. いよにす, 21: 27.
- 野本三男 (2005b) ツマグロキチョウ秋型の白化型. いよにす, 21: 35.
- 野本三男 (2005c) モンキチョウ♂白化型. いよにす, 21: 36-37.
- 野本三男 (2005d) モンキチョウ♀白化型. いよにす, 21: 37.
- 林慶 (1950) 四国よりシルヴィアシジミの記録. 昆虫学評論, 5 (1): 19.
- 林芳郎 (1968) 愛媛県でスジグロカバマダラを採集. 昆虫と自然, 3 (3): 5-6.
- 林弘 (1987) ウスイロコノマチョウの採集例. いよにす, 3: 29.
- 林弘 (2005) 愛媛県の迷チョウ5種の記録. 愛蝶会ニュース, 109: 28-29.
- 林弘 (2006) 第24回採集・調査会報告 チャマダラセセリの生息調査. いよにす, 22: 1-2.
- 林弘 (2009a) ヤクシマルリシジミが自宅の生け垣で発生. いよにす, 25: 35.
- 林弘 (2009b) ツマグロキチョウを自宅の庭で採集. いよにす, 25: 36.
- 林弘 (2010a) 愛媛県のオオムラサキ. いよにす, 26: 3-22.
- 林弘 (2010b) 我が家にクロセセリが来た!. いよにす, 26: 38-39.
- 林弘 (2011) チョウの集団吸水. いよにす, 27: 24.
- 林俊明・山岡幸雄・吉川茂樹 (1988) 私達のゼフィルス卵採集記録. いよにす, 4: 19-22.
- 福田哲也 (1988) ルリシジミの裏面斑紋の個体変異について. いよにす, 4: 34-35.
- 藤井康隆 (1988) 松山市米野町の蝶(1987). いよにす, 4: 15.
- 藤井康隆 (1993) 蛹化場所の知見(採集記録より). いよにす, 9: 38-39.
- 藤井康隆 (1998a) 市街地の蝶 (中間報告). 愛蝶会ニュース, 83: 4-5.
- 藤井康隆 (1998b) 市街地の蝶 (中間報告 part2). 愛蝶会ニュース, 84: 3-4.
- 藤井康隆 (2005) 第22回採集・調査会報告 チャマダラセセリの生息調査について. いよにす, 21: 1-2.
- 藤井康隆 (2009a) 2009年冬に確認できた蝶たち. 愛蝶会ニュース, 125: 4-6.
- 藤井康隆 (2009b) 2009年カバマダラの記録. 愛蝶会ニュース, 127: 8-9.
- 藤井康隆 (2011a) 蝶類観察記録. 愛蝶会ニュース, 133: 11.
- 藤井康隆 (2011b) キタキチョウ庭で越冬中. 愛蝶会ニュース, 133: 12.
- 藤井康隆 (2011c) オオムラサキ観察会を開催. 愛蝶会ニュース, 134: 6-8.
- 牧末四郎 (1912) 余が採集せる昆虫目録. 保惠會誌, 103: 75-93.
- 生物部* (1993) 松山市近郊に生息するチョウの分布調査. 青柳, 29: 73-80. (*愛媛県立松山東高等学校生物部).
- 増岡正義・是澤政甫 (1935) 蝶類の研究. 保惠會誌, 132: 89-96.
- 松田真平 (2009) ヤマトスジグロシロチョウとエゾスジグロシロチョウの学名に関する問題. やどりが, 219: 26-41.

- 真中二郎 (1998) 冬の蝶観察記録. 愛蝶会ニュース, 82: 5-6.
- 湊秀憲 (1986) ウスイロコノマチョウの採集記録. いよにす, 2: 40.
- 湊秀憲 (1987) 愛媛県におけるサツマジミの採集記録. いよにす, 3: 12-14.
- 宮武陸夫 (1955) 1955年の採集ノートから. あげは, 2: 54-65.
- 宮武陸夫・久松定成・岡田斉夫 (1956) 四国地方の採集地案内. 新昆虫, 9 (5): 22-24.
- 毛利輝典 (1952) 福見山の紹介 行状記 1. 松山昆虫同好会時報, 2: 16-19.
- 森川國康 (1939) 松山市付近の昆虫雑記 愛媛県の蝶類分布に関する所見 第一報. 昆虫界, 7 (68): 605-616.
- 矢野和之 (2008) 松山市高浜町経ヶ森でオオムラサキを採集. いよにす, 24: 46.
- 矢野和之 (2009a) 中予地方のクロマダラソテツジミ. いよにす, 25: 30.
- 矢野和之 (2009b) ヤクシマルリシジミがハマナスで発生. いよにす, 25: 34.
- 矢野和之 (2009c) 松山市内陸部においてヤクシマルリシジミの発生を確認. いよにす, 25: 36.
- 矢野和之 (2009d) 真冬にベニシジミを採集. いよにす, 25: 37.
- 矢野尚寿 (1998) ヤマトシジミの異常型. いよにす, 14: 13.
- 矢野尚寿・矢野和之 (1997) 松山市食場町にてオオチャバネセセリを採集. いよにす, 13: 7-8.
- 矢野雅広・楠博幸・宮久三千年 (1965) 伊台・瀬戸風峠の自然. 愛媛の自然, 7 (6): 4-5.
- 山岡幸雄 (1963) 福見川部落にキマダラモドキ産す. 松山昆虫同好会時報, 21: 3.
- 山岡幸雄 (1971) 愛媛県の蝶. むし, 6: 2-9.
- 山岡幸雄 (1988) ウスバシロチョウの異常型 2 例. いよにす, 4: 54.
- 山口和美 (2005) スジグロシロチョウの矮小型. いよにす, 21: 37.
- 吉川茂樹 (1994) ミドリシジミ採集案内. 虫だより, 28: 10-12.
- 吉富博之 (2011) 井上武さんを偲んで 付; 愛媛大学ミュージアム所蔵の愛媛県絶滅種のチョウ 5 種のデータ. いよにす, 27: 19-20.
- 和田重信 (1959a) 松山市内でゴイシシジミを採集. 松山昆虫同好会短報, 14: 3.
- 和田重信 (1959b) 杉立でサツマジミを採集. 松山昆虫同好会短報, 20: 4.